

'BERA LIOŃSKA'

Synonimy

'Liońska', 'Doyenné de Mérode',
'Doppelte Philippsbirne'

Pochodzenie

Odmiana belgijska



Fot. Grzegorz Hodun

Rodowód

Nieznany

Drzewo

Stosunkowo duże, korona luźna, szerokostożkowata z umiarkowanie sztywnymi pędami. Wchodzenie w owocowanie wczesne. Plonowanie obfite zwykle co drugi rok.

Podatność na choroby

Mała na parcha gruszy

Wytrzymałość na mróz

Dostateczna

Owoce

Najczęściej średniej wielkości, szerokostożkowate, lekko zaokrąglone przy szypułce, żółtawozielone, często z dość rozległym, gładkim, zielonkawym lub jasnobrązowym ordzawieniem. Kielich mały, otwarty lub półotwarty. Szypułka średnio długa, stosunkowo gruba. Miąższ kremowobiały, soczysty do bardzo soczystego, drobnoziarnisty do masłowego, kwaskowatosłodki, aromatyczny.

Dojrzałość zbiorcza

Zazwyczaj druga połowa sierpnia

Dojrzałość konsumpcyjna

Do tygodnia po zbiorze

Właściwości użytkowe

Owoce deserowe

Praca wykonana w ramach Programu Wieloletniego „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, finansowanego przez MRiRW.

Zadanie 1.7 – Poszerzanie różnorodności gatunków i odmian roślin ogrodniczych na obszarach wiejskich oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych.