

'BERGAMOTA LETNIA'

Synonimy

'Somerbergamottenbirn'

Pochodzenie

Nieznane



Fot. Grzegorz Hodun

Rodowód

Nieznany

Drzewo

Dość duże, korona lekko się zagęszczająca, szerokostojkowata z gałązkami lekko przewieszającymi się pod ciężarem owoców. Wchodzenie w owocowanie stosunkowo wczesne. Obfite plonowanie zazwyczaj co drugi rok.

Podatność na choroby

Mała na parcha gruszy

Wytrzymałość na mróz

Duża w starszym wieku

Owoce

Małe, najczęściej kuliste spłaszczone, żółtawozielonkawe lub zielonkawożółte z niezbyt mocnym, pomarańczowoczerwonym, zwykle niewielkim rumieńcem. Kielich średniej wielkości, otwarty. Szypułka dość gruba, krótka, położona w płytkim zagłębieniu. Miąższ żółtawy, umiarkowanie soczysty, drobnoziarnisty, kwaskowatosłodki, lekko aromatyczny.

Dojrzałość zbiorcza

Zwykle druga dekada sierpnia

Dojrzałość konsumpcyjna

Do tygodnia po zbiorze

Właściwości użytkowe

Owoce deserowe

Praca wykonana w ramach Programu Wieloletniego „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, finansowanego przez MRiRW.

Zadanie 1.7 – Poszerzanie różnorodności gatunków i odmian roślin ogrodniczych na obszarach wiejskich oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych.