

'PEPINA RIBSTONA'

Synonimy:

'Ribstona', 'Ribston Pippin', 'Ribston Pepping',
'Englische Granatrenette'

Pochodzenie:

odmiana angielska



Rodowód:

nieznany

Drzewo:

umiarkowanie duże z kulistą, lekko zagęszczającą się koroną. Wchodzenie w owocowanie średnio wczesne. Plonowanie obfite, z tendencją do przemienności

Podatność na choroby:

mała na parcha jabłoni

Wytrzymałość na mróz:

dość duża

Owoce:

wielkości, najczęściej kulistostożkowate, zielonkawożółte lub żółte, często z dużym, czerwonym, a czasami jaskrawoczerwonym, marmurkowo-smużkowym rumieńcem. Kielich mały, zamknięty lub półotwarty. Szypułka średniej długości i średniej grubości. Miąższ kremowy, umiarkowanie zwięzły, chrupki, soczysty, kwaskowato-słodki, lekko korzenny

Dojrzałość zbiorcza:

pierwsza połowa września

Dojrzałość konsumpcyjna:

2 do 4 tygodni

Właściwości użytkowe:

owoce do bezpośredniego spożycia i przerobu (na sok)

Praca wykonana w ramach Programu Wieloletniego „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, finansowanego przez MRiRW.

Zadanie 1.7 – Poszerzanie różnorodności gatunków i odmian roślin ogrodniczych na obszarach wiejskich oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych.