

'RENETA SZARA'

Synonimy:

'Graue Französische Renette',
'Echte graue französische Renette'

Pochodzenie:

nieznane



Fot. Grzegorz Hodun

Rodowód:

nieznany

Drzewo:

duże z kulistą, lekko zagęszczającą się koroną. Wchodzenie w owocowanie niezbyt wczesne. Obfite plonowanie zwykle co drugi rok

Podatność na choroby:

mała na parcha jabłoni

Wytrzymałość na mróz:

stosunkowo duża

Owoce:

dość duże, kuliste lekko spłaszczone, zielonkawe, z mniejszym lub większym ordzawieniem, czasami z niewielkim, czerwonym, marmurkowo-paskowanym rumieńcem. Kielich średniej wielkości, zwykle półotwarty. Szypułka średniej długości, rzadziej krótką, średniej grubości. Miąższ zielonkawy, zwięzły, umiarkowanie soczysty, wyraźnie kwaskowaty

Dojrzałość zbiorcza:

koniec września

Dojrzałość konsumpcyjna:

4 do 8 tygodni

Właściwości użytkowe:

owoce do suszenia i wykorzystania w kuchni

Praca wykonana w ramach Programu Wieloletniego „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, finansowanego przez MRiRW.

Zadanie 1.7 – Poszerzanie różnorodności gatunków i odmian roślin ogrodniczych na obszarach wiejskich oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych.