

'BRZOSKWINIOWA'

Synonimy:
'Jerozolimka'

Pochodzenie:
ostatecznie nieustalone, prawdopodobnie odmiana angielska



fot. Agnieszka Głowacka

Rodowód:
nieznany

Drzewo:
rośnie silnie. Początkowo tworzy wyniosłą, a w starszym wieku bardziej rozłożystą koronę. W okres owocowania wchodzi średnio wcześnie. Owocuje średnio obficie i zwykle przemiennie. Odmiana obcopleyna.

Podatność na choroby:
średnio duża na szarkę i mała na inne choroby śliwy

Wytrzymałość na mroz:
mała

Owoce:
duże, o masie 50-55g, kuliste, na wierzchołkach wyraźnie spłaszczone. Skórka początkowo zielonożółta, a u owoców w pełni dojrzałych różowożółta, pokryta bordowoczerwonym rumieńcem, zajmującym prawie całą jej powierzchnię oraz jasnym nalotem woskowym. Miąższ żółty, dość zwarty, soczysty, bardzo smaczny. Oddzielanie miąższu od pestki w dużej mierze zależy od stanowiska, na którym rosną drzewa. Pestka dość duża, szerokoeliptyczna.

Termin zbioru:
w pierwszej dekadzie sierpnia

Właściwości użytkowe:
odmiana deserowa

Praca wykonana w ramach Programu Wieloletniego „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, finansowanego przez MRiRW.

Zadanie 1.7 – Poszerzenie różnorodności gatunków i odmian roślin ogrodniczych na obszarach wiejskich oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych.