

● Parapetowe uprawy ● Altana od nowa ● Warzywne giganty ● Podsumowanie sezonu ● Dobre miody

działkowiec

Twój perfekcyjny ogród

Styczeń 2016 Nr 1 (785)

cena 4,70 zł (w tym 8% VAT)

Jak
odmłodzić
borówkę?

*Przepis
na eko
działkę:
modnie, zdrowo,
odpowiedzialnie*

Batalia
o kompostownik

*Doniczkowe
hity*

Pamiętaj o...

SERCU

**KWITNĄCE
ŻYWOPŁOTY**


**EUROPA
stawia na
OGRODY**

www.dzialkowiec.com.pl

www.facebook.com/perfekcyjnyogrod

Nr 110. 755674





Stare odmiany czereśni



mgr Agnieszka Głowacka, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

DECYDUJĄC SIĘ NA POSADZENIE CZEREŚNI NA DZIAŁCE, DOBRZE BYŁOBY WYBRAĆ TAKIE ODMIANY, KTÓRYCH DRZEWA SĄ WYTRZYMAŁE NA MRÓZ, MAŁO PODATNE NA RAKA BAKTERYJNEGO, A OWOCE NIE SĄ WRAŻLIWE NA PĘKANIE I GNICIE PODCZAS DESZCZU. WIELE Z TYCH CECH MAJĄ M.IN. DAWNE ODMIANY CZEREŚNI.

Chcąc uniknąć oprysków drzew przeciwko

nasionnicy trześniówce powodującej robaczywienie owoców należy wybierać odmiany wczesne, a więc takie, których owoce zbiera się zwykle przed 20 czerwca. Niestety, owoce wczesnych odmian czereśni, szczególnie te o czerwonej skórce, są bardzo lubiane przez ptaki.

DOBRA RADA

Czereśnie rosną silnie i zajmują dużo miejsca. Warto wybierać drzewka szczepione na podkładkach karłowatych (Gisela 5 lub 6, PHL A), które osiągną niewielkie rozmiary, wczesnie wchodzi w okres owocowania i dobrze plonują. Mają jednak większe wymagania glebowe. Najlepiej posadzić 2-3 drzewka różnych odmian, ponieważ większość czereśni jest obcopylna.

Co wybrać?

1 'Bładoróżowa' ('Miodówka Jasna')

Uprawiana w Polsce od lat 80. XIX wieku. Obecnie rośnie w ogrodach przydomowych i nasadzeniach kolekcyjnych. Drzewa tworzą bardzo duże, kuliste korony. W okres owocowania wchodzi średnio wczesnie, plonują regularnie i obficie. Owoce dojrzewają w drugiej dekadzie czerwca. Są średniej wielkości (6-7 g), sercowate, lekko wydłużone. Skórka jasnożółta, pokryta bładoróżowym rumieńcem, podatna na odgniecenia. Miąższ kremowy, miękki, słodki, dobrze odchodzący od pestki, bardzo smaczny. Sok bezbarwny. Pestka mała.

2 'Kanarkowa'

Odmiana spotykana do dziś w alejach przydrożnych i starych sadach przydomowych. Drzewa tworzą szerokostojkowate korony z gałęziami skierowanymi ku górze. W okres owocowania wchodzi średnio wczesnie, plonują dobrze



5



6



7

i regularnie. Owoce dojrzewają w drugiej połowie czerwca. Są małe (5–5,5 g), szerokokoscowate. Skórka żółta, lśniąca, podatna na odgniecenia. Miąższ jasnożółty, miękki, soczysty, słodki, bardzo smaczny. Sok bezbarwny. Pestka średniej wielkości.

3 'Wolska'

Odmiana znana od 1928 r., uprawiana głównie w rejonie Warszawy i w grójeckim. Jej drzewa tworzą luźne, kuliste korony o wzniesionych gałęziach. W okres owocowania wchodzi średnio wcześnie, plonują dość regularnie, ale zwykle średnio obficie. Owoce dojrzewają w drugiej połowie czerwca. Są średniej wielkości (5,5–7 g), sercowate, początkowo ciemnoczerwone, później prawie czarne. Miąższ ciemnoczerwony, dość jędrny, soczysty, kwaśno-słodki, bardzo smaczny. Sok ciemnoczerwony. Pestka duża.

4 'Kunzego' ('Kunzes Kirsche')

Odmiana popularna w latach 50. ubiegłego wieku. Drzewa tworzą

rozłożyste korony o mocnej konstrukcji. Plonują regularnie i obficie. Owoce dojrzewają w trzeciej dekadzie czerwca, są małe lub średnie (5–6 g), kuliste. Skórka żółta z jasnoczerwonym rumieńcem, który u dojrzałych owoców pokrywa prawie całą jej powierzchnię. Miąższ żółty, dość jędrny, soczysty, słodko-kwaśny, aromatyczny, bardzo smaczny. Sok bezbarwny. Pestka mała, nie przylega do miąższu.

5 'Lotka Trzebnicka' ('Długoszypułkowa')

Drzewa tworzą jajowate, dość rzadkie korony. Wcześnie wchodzi

w okres owocowania i plonują, w zależności od roku, dobrze lub średnio obficie. Owoce dojrzewają zwykle w trzeciej dekadzie czerwca. Są średniej wielkości (6–7 g), sercowate, wydłużone. Skórka lśniąca, dość gruba, brązowoczerwona, a w pełnej dojrzałości brązowoczarna. Miąższ ciemnoczerwony, średnio jędrny, słodko-kwaśny, smaczny. Sok ciemnoczerwony. Pestka duża.

6 'Büttnera Czerwona' ('Poznańska')

Odmiana wyhodowana w 1797 r., rozpowszechniona w uprawie w naszym kraju i do dziś spotykana

również w sadach towarowych. Jej drzewa tworzą kuliste korony z wzniesionymi konarami. Wcześnie wchodzi w okres owocowania, plonują obficie i corocznie. Owoce dojrzewają zwykle w drugiej dekadzie lipca. Są średniej wielkości lub duże (7–8 g), szerokokoscowate, jasnożółte, lśniące z czerwonym rumieńcem. Miąższ jasnożółty, jędrny, słodki, aromatyczny, bardzo smaczny. Sok bezbarwny. Pestka średniej wielkości.

7 'Dönissena Żółta'

Odmiana rzadko uprawiana, obecnie znajduje się głównie w nasadzeniach kolekcyjnych. Drzewa tworzą rozłożyste korony, plonują obficie i regularnie. Owoce dojrzewają w drugiej połowie lipca. Są małe lub średniej wielkości (5–6 g), szerokokoscowate, o zaokrąglonym wierzchołku. Skórka jasnożółta, lśniąca. Miąższ jasnożółty, dość jędrny, słodki, czasami z delikatną goryczką, smaczny zwłaszcza w pełnej dojrzałości. Sok bezbarwny. Pestka średniej wielkości. ■

Charakterystyka dawnych odmian czereśni

Odmiana	Sila wzrostu drzew	Wytrzymałość drzew na mroz	Wrażliwość na raka bakteryjnego i choroby grzybowe	Podatność owoców na pęknięcie
Bładoróżowa	b. duża	duża	mała	mała
Kanarkowa	duża/b. duża	duża	duża	mała
Wolska	duża	średnia	średnia	duża
Kunzego	duża	średnia	mała	średnia
Lotka Trzebnicka	duża	średnia	mała	mała
Büttnera Czerwona	duża/b. duża	duża	mała	duża
Dönissena Żółta	duża	duża	mała	duża