

ILUSTROWANY KATALOG 50 ODMIAN CZEREŚNI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W KOLEKCJI INSTYTUTU OGRODNICTWA

Opracowanie przygotowane w ramach **zadania 7.1:**

„Ochrona różnorodności biologicznej roślin sadowniczych i ozdobnych dla zrównoważonego rolnictwa”

Programu Wieloletniego:

„Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów”


Skierniewice 2012

'AELITA'

Pochodzenie: siewka z wolnego zapylania odmiany 'Drogana Żółta'

Miejsce wyhodowania: Donieck, Ukraina

Drzewo: rośnie średnio silnie. Tworzy rozłożystą, średniej gęstości koronę. Pędy jednoroczne umiarkowanie grube, pokryte średnio licznymi przetchlinkami. Liść średniej długości i szerokości, osadzony na średnio długim ogonku, miodniki jasnoczerwone. Drzewo kwitnie średnio późno i plonuje słabo. Wytrzymałość na mróz jest badana.



Zapylacze: 'Donczanka' i 'Donieckij Ugołek', 'Jarosławna' i 'Drogana Żółta'.

Owoc: średniej wielkości o masie ok. 7,0 g, kulisty. Skórka żółta z czerwonym rumieńcem pokrywającym prawie cały owoc. Miąższ jasnokremowy, słodko-kwaśny, smaczny, bardzo miękki. Sok bezbarwny. Pestka duża, owalna,

pękata. Szypułka średniej długości, 40 - 45 mm, średnio gruba.

Zbiór owoców: w siódmym tygodniu dojrzewania czereśni

Wrażliwość na raka bakteryjnego: średnia

Wrażliwość owoców na pęknięcie: mała

Właściwości użytkowe: Późno dojrzewająca jasnoowocowa odmiana czereśni. Ze względu na mało jędrne i wrażliwe na transport owoce może znaleźć zastosowanie tylko w uprawie amatorskiej.

‘BING’

Pochodzenie: Siewka z wolnego zapylania odmiany 'Republican'

Miejsce wyhodowania: Oregon, USA

Drzewo: rośnie średnio silnie, tworzy luźną koronę o sztywnych i wzniesionych ku górze konarach. Pędy jednoroczne średnio grube, pokryte średnio licznymi przetchlinkami. Liść średnio długi i średnio szeroki osadzony na długim ogonku, miodniki pomarańczowożółte. Drzewo wczesnie wchodzi w owocowanie, owocuje regularnie i średnio obficie. Jest wytrzymałe na mróz i mało podatne na choroby.

Zapylacze: 'Van', 'Vega'



Owoc: duży o masie 7 - 7,5 g, sercowaty, ostro zakończony. Skórka ciemnoczerwona z wyraźnie ciemniejszą linią szwu. Miąższ czerwony, intensywniej zabarwiony przy pestce, chrząstkowaty, soczysty, bardzo smaczny. Pestka, owalna, ścięta na wierzchołku. Szypułka średniej długości, dość gruba.

Zbiór owoców: w piątym tygodniu dojrzewania czereśni, kilka dni później niż owoców odmiany 'Van'

Wrażliwość na raka bakteryjnego: średnia

Wrażliwość owoców na pęknięcie: bardzo duża

Właściwości użytkowe: Odmiana czereśni wytrzymała na mróz, odznaczająca się regularnym i dość obfitym plonowaniem oraz dużymi, atrakcyjnymi owocami. Przydatność tej czereśni do nasadzeń towarowych ogranicza jednak duża podatność owoców na pęknięcie.

'BLADORÓŻOWA'

Pochodzenie: nieznane

Miejsce wyhodowania: nieznane

Drzewo: rośnie bardzo silnie, tworzy potężną szerokostożkowatą koronę. Pędy jednoroczne średnio grube, pokryte dużą liczbą przetchlinek. Liść długi i szeroki osadzony na średnio długim ogonku, miodniki pomarańczowożółte. Drzewo



plonuje obficie i corocznie. Jest wytrzymałe na mróz, a kwiaty i pąki kwiatowe są mało podatne na przymrozki.

Zapylacze: 'Büttnera Czerwona', 'Kassina', 'Hedelfińska'.



Owoc: duży, a przy obfitym plonowaniu średniej wielkości (5-6 g). Kształt sercowaty, wydłużony. Skórka kremowa pokryta blad różowym rumieńcem. Miąższ kremowy, miękki, słodki, dobrze odchodzący od pestki, bardzo smaczny.

Pestka mała, wydłużona. Szypułka długości około 40 mm, sztywna, zielona.

Zbiór owoców: w końcu drugiego lub na początku trzeciego tygodnia dojrzewania czereśni

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała

Wrażliwość owoców na pęknięcie: mała

Właściwości użytkowe: Odmiana deserowa o dużej plenności, wytrzymała na mróz i mało wrażliwa na raka bakteryjnego. Mimo tych zalet ma jedynie znaczenie amatorskie z powodu delikatnych i bardzo wrażliwych na transport owoców.

'BURLAT'

Pochodzenie: nieznane

Miejsce wyhodowania: Francja

Drzewo: rośnie bardzo silnie. Tworzy dość zagęszczoną koronę o mocnej konstrukcji z silnymi konarami wzniesionymi ku górze. Pędy jednoroczne średnio grube do grubych, pokryte dużą liczbą przetchlinek. Liść średnio długi i średnio szeroki, osadzony na średnio długim ogonku, miodniki jasnoczerwone. Drzewo średnio wcześnie wchodzi w okres owocowania, owocuje regularnie, średnio obficie. Jest dość wytrzymałe na mróz i mało podatne na choroby.



Zapylacze: 'Vega', 'Wczesna Riversa', 'Jaboulay', 'Hedelfińska', 'Van', 'Stark Hardy Giant'



Owoc: duży o średniej masie 6.5-7 g, szerokosercowaty, spłaszczony, pofałdowany. Skórka purpurowoczerwona, lśniąca, w pełnej dojrzałości prawie czarna. Miąższ ciemnoczerwony, jędrny, soczysty, bardzo smaczny. Pestka średniej wielkości, wydłużona. Szypułka długości około 35 mm, dość gruba.

Zbiór owoców: w trzecim tygodniu dojrzewania czereśni, najczęściej około 10 dni po odmianie 'Rivan'.

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała

Wrażliwość owoców na pęknięcie: średnia do dużej

Właściwości użytkowe: Owoce atrakcyjne o dużej wartości handlowej, dobrze znoszą transport. Odmiana przydatna do nasadzeń towarowych, a także do ogrodów działkowych, zwłaszcza jeśli drzewa są szczepione na podkładkach karłowatych.

‘BÜTTNERA CZERWONA’

(syn. ‘Poznańska’)

Pochodzenie: nieznane

Miejsce wyhodowania: Niemcy

Drzewo: rośnie silnie lub bardzo silnie. Tworzy kulistą koronę ze wzniesionymi ku górze konarami i zwisającymi końcami gałązek. Pędy jednoroczne średnio grube, pokryte małą liczbą przetchlinek. Liść średnio długi i średnio szeroki,



osadzony na średnio długim ogonku, miodniki pomarańczowożółte. Drzewo jest wytrzymałe na mróz, a pąki kwiatowe i kwiaty są mało wrażliwe na przymrozki, dzięki czemu plonowanie jest obfite i coroczne.

Zapylacze: ‘Van’, ‘Vega’, ‘Kunzego’, ‘Hedelfińska’



Owoc: średniej wielkości lub duży o masie 7,0-8,0g, szeroko sercowaty. Skórka jasnożółta, lśniąca z czerwonym cętkowanym rumieńcem. Miąższ jasnożółty, chrząstkowaty, słodki, aromatyczny. Sok bezbarwny. Pestka średniej wielkości, zaczerwieniona. Szypułka dość długa, około 45 mm, przy owocu zgrubiała.

Zbiór owoców: na przełomie szóstego i siódmego tygodnia dojrzewania czereśni

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała

Wrażliwość owoców na pęknięcie: duża

Właściwości użytkowe: odmiana późna, dojrzewająca najczęściej w drugiej dekadzie lipca, dobrze przystosowana do warunków klimatycznych Polski. Coraz rzadziej jest uprawiana w sadach towarowych, ponieważ jakością owoców ustępuje nowszym późnym odmianom. Jej wadą jest duża podatność owoców na pęknięcie i gnienie w czasie opadów deszczu. Odmiana przydatna do ogrodów działkowych.

‘DÖNISSENA ŻÓŁTA’

Pochodzenie: przypadkowa siewka

Miejsce wyhodowania: Niemcy

Drzewo: rośnie silnie, tworzy koronę początkowo wzniesioną ku górze, a z upływem lat bardziej rozłożystą. Pędy jednoroczne średnio grube, pokryte średnią liczbą przetchlinek. Liść średnio długi i średnio szeroki, osadzony na średnio długim ogonku, miodniki zielonkawożółtawe. Drzewo wczesnie wchodzi w okres owocowania, plonuje regularnie i bardzo obficie. Jest wytrzymałe na mróz.



Zapylacze: 'Kunzego', 'Schneidera Późna', 'Hedelfińska'.



Owoc: mały lub średni o masie 4,5-5,0 g, szerokosercowaty, o zaokrąglonym czubku. Skórka jasnożółta bez rumieńca, cienka. Miąższ żółty, dość twardy, mało soczysty, słodki, dość smaczny. Półchrząstka. Sok bezbarwny. Pestka średniej wielkości, pękata. Szypułka długa, około 45-50 mm, średniej grubości.

Zbiór owoców: w szóstym tygodniu dojrzewania czereśni, przeważnie w połowie lipca. Okres dojrzałości zbiorczej jest długi.

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała

Wrażliwość owoców na pękanie: duża

Właściwości użytkowe: Jest jedną z wartościowszych odmian czereśni o żółtych owocach. Czereśnie tego typu są popularne w Japonii, a w Polsce cieszą się małym powodzeniem i dlatego są rzadko uprawiane. Wadą odmiany jest duża wrażliwość owoców na pękanie i odgniatanie się podczas transportu.

'GUBIŃSKA CZARNA'

Pochodzenie: nieznane

Miejsce wyhodowania: Niemcy

Drzewo: rośnie średnio silnie, tworzy niewielką, kulistą koronę, zwykle bez przewodnika. W okres owocowania wchodzi dość późno. Plonuje regularnie i średnio obficie. Jest średnio wytrzymałe na mróz.



Zapylacze: 'Sam', 'Büttnera Czerwona'



Owoc: średniej wielkości o masie około 6,0-6,5 g. Kształtem bardzo przypomina czereśnie odmiany 'Van'. Skórka czarna, lśniąca. Miąższ bardzo ciemny, z odcieniem fioletowym, twardy, soczysty, słodki, lekko aromatyczny, prawie bez goryczki, smaczny. Chrząstka. Sok bardzo ciemny. Pestka dość duża, pękata. Szypułka krótka, gruba.

Zbiór owoców: owoce zaczynają dojrzewać na początku piątego tygodnia dojrzewania czereśni, ale można je długo przetrzymać na drzewie.

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała

Wrażliwość owoców na pęknięcie: mała


Właściwości użytkowe: Ze względu na słaby wzrost drzew i małą wrażliwość na raka bakteryjnego 'Gubińska Czarna' jest polecana do ogrodów działkowych. Do uprawy towarowej mniej przydatna, gdyż nie wytrzymuje konkurencji z innymi dojrzewającymi o tej samej porze odmianami wielkoowocowymi.

'HEDELFIŃSKA'

Pochodzenie: nieznane

Miejsce wyhodowania: Niemcy

Drzewo: rośnie silnie. Tworzy rozłożystą koronę ze zwisającymi gałęziami. Pędy jednoroczne średnio grube, pokryte dość licznymi przetchlinkami. Liść średniej długości i szerokości, osadzony na średnio długim ogonku, miodniki pomarańczowożółte. Drzewo jest mało wytrzymałe na mróz. W okres owocowania wchodzi średnio wcześnie. Owocuje obficie i regularnie.



Zapylacze: 'Sam', 'Summit', 'Schneidera Późna', 'Napoleona', 'Büttnera Czerwona'.

Owoc: duży o masie 7,5 - 8,5 g, wydłużony. Skórka wiśniowobrązowa, lśniąca. Miąższ ciemnoczerwony, chrząstkowaty, bardzo smaczny. Pestka średniej wielkości, jajowata, wydłużona. Szypułka średniej długości, dość gruba.

Zbiór owoców: w szóstym lub w siódmym tygodniu dojrzewania czereśni, przeważnie w drugiej dekadzie lipca.

Wrażliwość na raka bakteryjnego: duża

Wrażliwość owoców na pęknięcie: duża


Właściwości użytkowe: odmiana, której owoce mają dużą wartość handlową. Mimo wad takich jak duża wrażliwość na mróz i na raka bakteryjnego oraz podatność owoców na pęknięcie jest nadal uważana przez wielu sadowników za cenną ciemnoowocową odmianę czereśni o późnej porze dojrzewania owoców.

'HEIDEGGER'

Pochodzenie: siewka nieznanego pochodzenia

Miejsce wyhodowania: Szwajcaria

Drzewo: rośnie silnie, tworzy luźną koronę o mocnej konstrukcji. Konary grube, wzniesione ku górze, mało rozgałęziające się. Pędy jednoroczne umiarkowanie grube, pokryte średnio licznymi przetchlinkami. Liść długi i wąski, osadzony na długim ogonku, miodeńki pomarańczowożółte. Drzewo wchodzi dość późno w okres owocowania, plonuje regularnie, średnio obficie. Jest dość wrażliwe na mróz.



Zapylacze: 'Vega', 'Sam'

Owoc: średniej wielkości o masie około 7 g, nerkowatego kształtu. Skórka dość gruba, ciemnoczerwona, błyszcząca. Miąższ czerwony, ciemniejszy przy pestce, twardy z lekką goryczką, soczysty, smaczny. Pestka dość duża, wydłużona, pękata. Szypułka długa, około 50 mm, wiotka.

Zbiór owoców: owoce dojrzewają w końcu piątego tygodnia dojrzewania czereśni.

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała

Wrażliwość owoców na pęknięcie: mała


Właściwości użytkowe: Odmiana interesująca ze względu na małą podatność owoców na pęknięcie i dużą wytrzymałość na transport. Jej uprawę w Polsce ogranicza dość duża wrażliwość drzew na mróz i zbyt drobne owoce w porównaniu z innymi odmianami o podobnej porze dojrzewania.

'HULDRA'

Pochodzenie: 'Erianne' x 'Almän Gulröd'

Miejsce wyhodowania: Szwecja

Drzewo: rośnie średnio silnie. Tworzy rozłożystą, średniej gęstości koronę. Pędy jednoroczne umiarkowanie grube, pokryte średnio licznymi przetchlinkami. Liść średniej długości i szerokości, osadzony na średnio długim ogonku, miodniki pomarańczowożółte. Drzewo wczesnie wchodzi w okres owocowania i dobrze plonuje. Jest wytrzymałe na mróz.



Zapylacze: będą badane

Owoc: średniej wielkości o masie ok. 6,5 g, sercowaty. Skórka ciemnoczerwona, a w pełnej dojrzałości owocu prawie czarna, lśniąca. Miąższ czerwony, dość jędrny, średnio smaczny. Pestka średniej wielkości lub duża, wydłużona. Szypułka średniej długości, ok. 40 mm, średnio gruba.

Zbiór owoców: w szóstym tygodniu dojrzewania czereśni.

Wrażliwość na raka bakteryjnego: duża

Wrażliwość owoców na pęknięcie: mała

Właściwości użytkowe: 'Huldra' może znaleźć zastosowanie w uprawie amatorskiej. Do sadów towarowych jest mało przydatna ze względu na zbyt drobne owoce.

‘JABOULAY’

(syn. ‘Żabula’, ‘Liońska’, ‘Ramon Oliwa’)


Pochodzenie: nieznane

Miejsce wyhodowania: Francja

Drzewo: rośnie bardzo silnie. Tworzy rozłożystą, nieregularnie zbudowaną koronę z długimi, powyginanymi konarami. Pędy jednoroczne średnio grube, pokryte średnio licznymi przetchlinkami. Liść długi i wąski, osadzony na średnio długim ogonku, miódniki ciemnoczerwone. W okres owocowania wchodzi późno, w 4-5 roku po posadzeniu. Plonuje średnio obficie. Jest dość wytrzymałe na mróz.



Zapylacze: ‘Hedelfińska’, ‘Wczesna Riversa’.



Owoc: średniej wielkości o masie 5,5 - 6,5 g, szerokokoscowaty, lekko spłaszczony z charakterystycznym żeberkiem wzdłuż linii szwu. Skórka ciemnoczerwona, błyszcząca. Miąższ dość twardy, soczysty, aromatyczny, smaczny. Półchrząstka. Pestka duża, wydłużona. Szypułka długa (45 - 50 mm), dość gruba, zielona.

Zbiór owoców: W trzecim tygodniu dojrzewania czereśni. Owoce dojrzewają bardzo nierównomiernie.

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała do średniej

Wrażliwość owoców na pęknięcie: bardzo duża

Właściwości użytkowe: ‘Jaboulay’ była dość popularna w sadach i ogrodach przydomowych. Została jednak zastąpiona przez bardziej od niej wartościową odmianę ‘Burlat’.

'JOHANNA'

Pochodzenie: 'Schneidera Późna' x 'R 57/104'


Miejsce wyhodowania: Niemcy

Drzewo: rośnie silnie. W okres owocowania wchodzi średnio wcześnie i plonuje umiarkowanie obficie. Pędy jednoroczne średnio grube, pokryte nielicznymi przetchlinkami. Liść średnio długi i średnio szeroki osadzony na długim ogonku, miodniki ciemnoczerwone.



Drzewo średnio wcześnie wchodzi w okres owocowania i plonuje umiarkowanie obficie.

Zapylacze: 'Burlat', 'Vega'.



Owoc: średniej wielkości o masie około 6,5 g, sercowaty, pofałdowany przy szypułce. Skórka ciemnoczerwona, lśniąca. Miąższ czerwony, przy pestce ciemniejszy, początkowo półchrząstkowaty, ale u owoców dojrzałych miękki. Pestka średniej wielkości, wydłużona. Szypułka długa i średnio gruba, jasnozielona.

Zbiór owoców: W końcu trzeciego i na początku czwartego tygodnia dojrzewania czereśni.

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała

Wrażliwość owoców na pękanie: średnia

Właściwości użytkowe: 'Johanna' jest przydatna do uprawy amatorskiej. Do uprawy towarowej nie jest polecana ze względu na zbyt drobne i miękkie owoce.

‘KARESOVA’

(syn. ‘Karesova Rana’)

Pochodzenie: siewka nieznanego pochodzenia

Miejsce wyhodowania: Czechy

Drzewo: rośnie średnio silnie. Tworzy kształtną, gęstą, stożkową lub kulistą koronę o średnio silnej konstrukcji. Niżej położone gałęzie zwisają ku dołowi. Pędy jednoroczne grube, pokryte nielicznymi przetchlinkami. Liść średniej długości



i szerokości, osadzony na długim ogonku, miodniki pomarańczowożółte. Drzewo jest średnio wrażliwe na mróz, wcześniej wchodzi w okres owocowania, plonuje regularnie i obficie.

Zapylacze: 'Wczesna Riversa', 'Merton Premier', 'Schneidera Późna'



Owoc: średniej wielkości, o masie około 6,0 g, kształtu sercowatego. Skórka cienka, ciemnoczerwona z odcieniem brązowym. Miąższ czerwony, średnio twardy, soczysty, aromatyczny, bardzo smaczny. Sok ciemnoczerwony. Pestka mała, o zaokrąglonych licach. Szypułka długa i dość cienka.

Zbiór owoców: w trzecim tygodniu dojrzewania czereśni, prawie równocześnie z odmianą ‘Burlat’ lub 2-3 dni później.

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała

Wrażliwość owoców na pęknięcie: mała do średniej

Właściwości użytkowe: wczesna odmiana czereśni o smacznych i mało podatnych na pęknięcie owocach, charakteryzująca się wysoką zdrowotnością drzew. Przydatna do ogrodów działkowych. Ze względu na małą podatność owoców na pęknięcie ‘Karesova’ może być uprawiana zamiast odmiany ‘Burlat’ w rejonach o dużej ilości opadów, np. na Podkarpaciu.

'KARINA'

Pochodzenie: 'Schneidera Późna' x 'Rube'

Miejsce wyhodowania: Niemcy

Drzewo: rośnie silnie. Tworzy kształtną, szerokostojkowatą koronę. Pędy jednoroczne średniej grubości, pokryte nielicznymi przetchlinkami. Liść średniej długości i szerokości, osadzony średnio długim ogonku. Drzewo wcześnie wchodzi w okres owocowania, plonuje obficie i regularnie. Jest dość wytrzymałe na mróz.



Zapylacze: 'Alma', 'Bianca'



Owoc: duży o masie 7,5 - 9,0 g, szerokosercowaty. Skórka ciemnoczerwona, błyszcząca. Miąższ jasnoczerwony, chrząstkowaty, soczysty, aromatyczny, smaczny. Pestka średniej wielkości, wydłużona. Szypułka dość długa, około 45 mm, średniej grubości, zielona, lekko ordzawiona.

Zbiór owoców: w siódmym tygodniu dojrzewania czereśni.

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała do średniej

Wrażliwość owoców na pęknięcie: mała

Właściwości użytkowe: 'Karina' jest atrakcyjną, dobrze plonującą, późną odmianą czereśni. Zyskuje ona coraz większe uznanie wśród sadowników, chociaż jej owoce wyglądem i smakiem nie dorównują dojrzewającej w podobnym terminie odmianie 'Kordia'. Drzewa są jednak bardziej wytrzymałe na mróz i mniej niezawodne w plonowaniu.

'KAVICS'

Pochodzenie: 'Germersdorfska' x 'Budakalasz'

Miejsce wyhodowania: Węgry

Drzewo: rośnie średnio silnie. Tworzy rozłożystą, średniej gęstości koronę. Pędy jednoroczne umiarkowanie grube, pokryte średnio licznymi przetchlinkami. Liść długi i średnio szeroki, osadzony na średnio długim ogonku, miodniki pomarańczowożółte. Drzewo jest dość wytrzymałe na mróz. Kwitnie średnio wcześnie, a plonuje zwykle słabo, ponieważ pąki kwiatowe są uszkodzane przez późnowiosenne przymrozki.



Zapylacze: 'Stella', 'Van', 'Katalin'



Owoc: duży o masie 8,0-8,5 g, sercowaty. Skórka ciemnoczerwona, a w pełnej dojrzałości prawie czarna. Miąższ ciemnoczerwony, bardzo ciemny przy pestce, wyjątkowo twardy, smaczny. Pestka średniej wielkości, wydłużona. Szypułka dość krótka, ok. 30-35 mm długości, średnio gruba.

Zbiór owoców: w końcu szóstego lub na początku siódmego tygodnia dojrzewania czereśni.

Wrażliwość na raka bakteryjnego: w trakcie badań

Wrażliwość owoców na pęknięcie: mała

Właściwości użytkowe: odmiana o atrakcyjnych, bardzo twardych owocach, ale niestety bardzo zawodna w plonowaniu w warunkach klimatycznych Polski.

'KORDIA'

Pochodzenie: nieznane

Miejsce wyhodowania: Czechy

Drzewo: rośnie początkowo silnie, a w pełni owocowania średnio silnie. Tworzy szerokostojkowatą koronę, która z czasem staje się bardziej rozłożysta. Pędy jednoroczne średnio grube, pokryte nielicznymi przetchlinkami. Liść średniej długości i szerokości, osadzony na średnio długim ogonku, miodniki jasnoczerwone. Drzewo wczesnie wchodzi w okres owocowania, plonuje dobrze i dość regularnie. Jest mało podatne na choroby, ale w czasie surowych zim przemarza. Pąki kwiatowe są dość często uszkodzane przez mróz lub późnowiosenne przymrozki.



Zapylacze: 'Schneidera Późna', 'Van', 'Sam', 'Heidegger', 'Hedelfińska'



Owoc: duży lub bardzo duży o masie 8,0 - 10,0 g, sercowaty, wydłużony. Skórka karminowoczerwona z odcieniem brązowym, lśniąca. Miąższ twardy, chrząstkowaty, jasnoczerwony, aromatyczny, bardzo smaczny. Pestka duża, lekko wygięta przy wierzchołku. Szypułka długości ok. 45 mm, średniej grubości.

Zbiór owoców: w siódmym tygodniu dojrzewania czereśni, po owocach odmiany 'Hedelfińska'.

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała

Wrażliwość na pęknięcie: średnia

Właściwości użytkowe: 'Kordia' jest bardzo wartościową, późną odmianą czereśni o dorodnych, smacznych owocach, głównie deserowych, które mają bardzo dużą wartość handlową. Polecana do sadów towarowych i amatorskich przede wszystkim w najcieplejszych rejonach kraju.

'KRISTIN'

Pochodzenie: brak danych

Miejsce wyhodowania: USA

Drzewo: rośnie silnie. Tworzy rozłożystą koronę ze zwisającymi dolnymi gałęziami. Pędy jednoroczne średnio grube, pokryte średnio licznymi przetchlinkami. Liść średniej długości i szerokości, osadzony na średnio długim ogonku, miodniki pomarańczowożółte. Drzewo wcześnie wchodzi w okres owocowania. Owocuje bardzo obficie i regularnie. Na mróz jest średnio wytrzymałe.



Zapylacze: 'Hedelfińska', 'Jaboulay', 'Kassina', 'Schneidera Późna'



Owoc: średniej wielkości o masie około 6 g, szerokosercowaty. Skórka cienka, ciemnoczerwona z silnym połyskiem, w pełnej dojrzałości prawie czarna. Miąższ ciemnoczerwony, dość twardy, aromatyczny, bardzo smaczny. Pestka mała, jajowata. Szypułka dość długa, ok. 45 mm, cienka, lekko ordzawiona.

Zbiór owoców: na przełomie piątego i szóstego tygodnia dojrzewania czereśni, przeważnie w końcu czerwca lub na początku lipca.

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała

Wrażliwość owoców na pęknięcie: mała

Właściwości użytkowe: Odmiana plenna, o smacznych i mało podatnych na pęknięcie owocach, przydatna głównie do nasadzeń amatorskich. Pod względem wielkości owoców nie wytrzymuje konkurencji z innymi odmianami dojrzewającymi w podobnym terminie.

'KRUPNOPŁODNA'

Pochodzenie: 'Napoleon Biełaja' x mieszanina pyłku odmian: 'Walerij Czkałow' + 'Elton' + 'Jaboulay'.

Miejsce wyhodowania: Melitopol, Ukraina

Drzewo: rośnie silnie. Tworzy rozłożystą, średnio zagęszczoną koronę. Pęd jednoroczny średniej grubości, pokryty średnio licznymi przetchlinkami. Liść średniej długości i szerokości, osadzony na średnio długim ogonku. Plonuje dość dobrze i regularnie. Odmiana wytrzymała na mróz.



Zapylacze: 'Emperor Francis'

Owoc: duży lub bardzo duży o masie 9,0 – 10 g, kulisty lub prawie nerkowaty. Skórka ciemnoczerwona z połyskiem, a w pełnej dojrzałości - prawie czarna. Miąższ ciemnoczerwony, twardy, chrząstkowaty. Pestka średniej wielkości, owalna.

Zbiór owoców: w siódmym tygodniu dojrzewania czereśni.

Wrażliwość na raka bakteryjnego: w trakcie badań

Wrażliwość owoców na pękanie: bardzo duża

Właściwości użytkowe: atrakcyjna odmiana czereśni o późnym terminie dojrzewania owoców. Jej przydatność do uprawy w Polsce ogranicza jednak bardzo duża podatność owoców na pękanie.

'KUNZEGO'


Pochodzenie: nieznane

Miejsce wyhodowania: Niemcy

Drzewo: rośnie silnie. Tworzy rozłożystą koronę ze zwisającymi dolnymi gałęziami. Pędy jednoroczne średnio grube, pokryte nielicznymi przetchlinkami. Liść długi i wąski, osadzony na średnio długim ogonku, miodniki pomarańczowożółte. Drzewo wczesnie wchodzi w okres owocowania. Owocuje bardzo obficie i regularnie. Na mróz jest średnio wytrzymałe.



Zapylacze: 'Hedelfińska', 'Jaboulay', 'Kassina', 'Schneidera Późna'



Owoc: średniej wielkości o masie 5-6 g, szerokokoscowaty, ścięty na wierzchołku. Skórka cienka, jasnożółta, pokryta karminowym rumieńcem, który u owoców dojrzałych pokrywa prawie całą powierzchnię. Miąższ jasnożółty, dość ścisły, słodki, aromatyczny, smaczny. Pestka mała, pękata. Szypułka długa, lekko ordzawiona.

Zbiór owoców: w czwartym tygodniu dojrzewania czereśni, przeważnie w końcu czerwca.

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała

Wrażliwość owoców na pęknięcie: mała

Właściwości użytkowe: odmiana plenna, przydatna do nasadzeń amatorskich w cieplejszych rejonach kraju. Owoce są bardzo smaczne, ale niezbyt duże i mało wytrzymałe na transport.

'LAMBERT'


Pochodzenie: 'Napoleona' x 'Black Heart'

Miejsce wyhodowania: Oregon, USA

Drzewo: rośnie silnie. Tworzy gęstą, rozłożystą koronę o mocnej konstrukcji. Pędy jednoroczne średnio grube, pokryte dużą liczbą przetchlinek. Liść średniej długości i szerokości, osadzony na średnio długim ogonku, miodniki pomarańczowożółte. Drzewo średnio wcześnie wchodzi w okres owocowania, ale plonuje corocznie. Jest średnio wytrzymałe na mróz.



Zapylacze: 'Kunzego', 'Van', 'Hedelfińska', 'Schneidera Późna'.



Owoc: duży lub bardzo duży o średniej masie 8,0 - 8,5 g, a w sprzyjających warunkach jeszcze większy (do 10 g), sercowaty. Skórka bordowoczerwona z połyskiem. Miąższ czerwony, chrząstkowaty, soczysty i smaczny. Pestka średniej wielkości, wydłużona. Szypułka średniej długości (ok. 45 mm) i grubości, jasnozielona.

Zbiór owoców: na przełomie siódmego i ósmego tygodnia dojrzewania czereśni, po odmianie Hedelfińska.

Wrażliwość na raka bakteryjnego: średnia do małej

Wrażliwość owoców na pęknięcie: bardzo duża

Właściwości użytkowe: interesująca odmiana czereśni o bardzo późnej porze dojrzewania owoców i wysokiej plenności drzew. Uprawę tej czereśni ogranicza jednak bardzo duża podatność owoców na pęknięcie i gnicie w czasie deszczu.

'LAPINS'

Pochodzenie: 'Van' x 'Stella'

Miejsce wyhodowania: Summerland, Kanada

Drzewo: rośnie umiarkowanie silnie. Tworzy zwartą koronę o konarach wzniesionych ku górze. Pędy jednoroczne umiarkowanie grube, pokryte średnio licznymi przetchlinkami. Liść średniej długości i szerokości, osadzony na średnio długim ogonku, miodniki zielonkawożółte. Drzewo wcześnie wchodzi w okres owocowania, plonuje dobrze i regularnie. Jest mało wytrzymałe na mróz, dlatego przy sadzeniu należy zwrócić uwagę na korzystną lokalizację sadu.



Zapylacze: odmiana samopłodna



Owoc: duży lub bardzo duży o masie 8,5 – 9,0 g, kulisty, spłaszczony na wierzchołku. Skórka pomarańczowoczerwona z połyskiem. Miąższ jasnoczerwony, chrząstkowaty, soczysty, umiarkowanie aromatyczny, bardzo smaczny. Sok jasnoczerwony. Pestka średniej wielkości, kulista. Szypułka średniej długości, dość gruba.

Zbiór owoców: w siódmym tygodniu dojrzewania czereśni.

Wrażliwość na raka bakteryjnego: w trakcie badań

Wrażliwość owoców na pękanie: mała

Właściwości użytkowe: 'Lapins' jest atrakcyjną, późno dojrzewającą, samopłodną odmianą czereśni. Owoce zawiązują się w skupiskach, w związku z czym w wilgotne lata są dość podatne na gnienie. Dobrze znoszą transport oraz są przydatne do przechowywania w chłodni.

‘LINDA’


Pochodzenie: ‘Hedelfińska’ x ‘Germersdorfska’

Miejsce wyhodowania: Węgry

Drzewo: rośnie umiarkowanie silnie lub silnie. Tworzy luźną, rozłożystą koronę. Pędy jednoroczne średnio grube, pokryte nielicznymi przetchlinkami. Liść średniej długości i szerokości, osadzony na średnio długim ogonku, miodniki pomarańczowożółte. W warunkach klimatycznych Węgier wchodzi w okres owocowania, plonuje corocznie i bardzo obficie. W Polsce niestety jest zawodna w plonowaniu, ponieważ jej pąki kwiatowe są wrażliwe na późnowiosenne przymrozki.



Zapylacze: ‘Margit’, ‘Germersdorfska’, ‘Van’, ‘Hedelfińska’, ‘Katalin’



Owoc: duży lub bardzo duży o masie 8,5 – 10 g. Skórka dość gruba, wiśniowoczerwona, błyszcząca. Miąższ czerwony, chrząstkowaty, słodko-kwaskowy, bardzo smaczny. Pestka średniej wielkości, kulista lub lekko wydłużona. Szypułka długa, ok. 50-55 mm, średniej grubości, jasnozielona.

Zbiór owoców: na przełomie szóstego i siódmego tygodnia dojrzewania czereśni.

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała

Wrażliwość owoców na pęknięcie: średnia

Właściwości użytkowe: Na Węgrzech ‘Linda’ uważana jest za duże osiągnięcie hodowlane. Zastępuje tam powszechnie uprawianą odmianę ‘Germersdorfska’. Owoce są przydatne do bezpośredniej konsumpcji oraz do przetwórstwa. Jej przydatność do uprawy w warunkach klimatycznych Polski ogranicza słabe plonowanie.

‘LOTKA TRZEBNICKA’

Pochodzenie: nieznane

Miejsce wyhodowania: Polska

Drzewo: rośnie silnie, tworzy rzadką, nieregularną i trudną do formowania koronę ze zwisającymi dolnymi gałęziami. Jest średnio wytrzymałe na mróz i mało podatne na choroby. Pędy jednoroczne średniej grubości, pokryte średnio licznymi przetchlinkami. Liść długi i średnio szeroki, osadzony na długim ogonku, miodniki jasnoczerwone. Drzewo średnio wcześnie wchodzi w okres owocowania i dość dobrze plonuje.



Zapylacze: ‘Kunzego’, ‘Büttnera Czerwona’, ‘Hedelfińska’



Owoc: średniej wielkości o masie 6,0 - 7,0 g, sercowaty, wydłużony. Skórka lśniąca, dość gruba, barwy brązowoczerwonej, a w pełnej dojrzałości brązowo czarna. Miąższ ciemnoczerwony, półchrząstkowaty, słodko-winny, bardzo smaczny. Pestka duża, wydłużona o licach jajowatych. Szypułka bardzo długa (50 - 60 mm), wiotka.

Zbiór owoców: w czwartym tygodniu dojrzewania czereśni, przeważnie pod koniec czerwca lub na początku lipca.

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała

Wrażliwość owoców na pękanie: mała

Właściwości użytkowe: Odmiana deserowa i przetwórcza, przydatna do ogrodów działkowych. Bardzo dobrze owocuje zwłaszcza w Polsce południowo-zachodniej.

'ŁUCZISTAJA'

Pochodzenie: 'Dönissena Żółta' x 'Jaboulay'

Miejsce wyhodowania: Ukraina

Drzewo: rośnie średnio silnie. Tworzy rozłożystą, dość luźną koronę. Drzewo jest wytrzymałe na mróz. Kwitnie średnio wcześnie, wcześnie wchodzi w okres owocowania i obficie, corocznie plonuje.



Zapylacze: będą badane



Owoc: średniej wielkości o masie ok. 6,5 g, sercowaty. Skórka żółta, ale znaczną jej powierzchnię pokrywa czerwony rumieniec. Miąższ kremowobiały, dość miękki, słodko-kwaskowy, smaczny. Sok bezbarwny. Pestka średniej wielkości, owalna. Szypułka długa, ok. 50-55 mm i dość gruba.

Zbiór owoców: pod koniec trzeciego tygodnia dojrzewania czereśni.

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała

Wrażliwość owoców na pękanie: mała

Właściwości użytkowe: Dobrze plonująca odmiana o smacznych, ale zbyt miękkich owocach. Przydatna do uprawy amatorskiej.

'MELITOPOLSKA RANNA'

Pochodzenie: 'Emperor Francis' x 'Marchijska'

Miejsce wyhodowania: Melitopol, Ukraina

Drzewo: rośnie silnie. Tworzy półwzniesioną, dość zagęszczoną koronę. Pęd jednoroczny średniej grubości, pokryty licznymi przetchlinkami. Antocyjanowe zabarwienie wierzchołka średnio silne. Liść jasnozielony, bez połysku, średniej długości i szerokości, osadzony na średnio długim ogonku. Miodniki ciemnoczerwone. Drzewo wchodzi średnio wcześnie w okres owocowania, najczęściej w trzecim roku po posadzeniu. Plonuje obficie i regularnie. Jest wytrzymałe na mróz.



Zapylacze: 'Walerij Czałow', 'Skorospietka'



Owoc: średniej wielkości o masie 5,0-5,5 g, kulisty, spłaszczony na wierzchołkach. Skórka ciemnoczerwona z połyskiem. Miąższ czerwony, dosyć miękki, średnio soczysty, smaczny. Sok czerwony. Pestka średniej wielkości, kulista. Szypułka średniej długości, około 40-45 mm, dość gruba, zielona.

Zbiór owoców: w drugim tygodniu dojrzewania czereśni, pomiędzy odmianą 'Rivan' i 'Burlat'.

Wrażliwość na raka bakteryjnego: w trakcie badań

Wrażliwość owoców na pęknięcie: średnia

Właściwości użytkowe: Interesująca odmiana czereśni ze względu na wczesne dojrzewanie owoców. Jej przydatność do uprawy w Polsce jest badana.

‘MERCHANT’

Pochodzenie: siewka z wolnego zapylenia odmiany ‘Merton Glory’

Miejsce wyhodowania: Anglia

Drzewo: rośnie średnio silnie, tworzy szeroką, rozłożystą koronę o konarach odchodzących od pnia pod szerokim kątem. Pędy jednoroczne umiarkowanie grube, pokryte średnio licznymi przetchlinkami. Liść długi i średnio szeroki, osadzony na średnio długim ogonku, miodniki ciemnoczerwone. Drzewo kwitnie wcześnie, plonuje średnio dobrze, a czasami słabo, ponieważ pąki kwiatowe są podatne na uszkodzenia przez późnowiosenne przymrozki.



Zapylacze: ‘Vega’



Owoc: średniej wielkości lub duży o masie 7,5-8,0 g. Skórka ciemnoczerwona, a w pełnej dojrzałości prawie czarna, błyszcząca. Miąższ czerwony, dość twardy, bardzo smaczny. Sok czerwony. Pestka dość duża, wydłużona. Szypułka dość długa, gruba.

Zbiór owoców: pod koniec czwartego lub na początku piątego tygodnia dojrzewania czereśni.

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała

Wrażliwość owoców na pęknięcie: mała

Właściwości użytkowe: ‘Merchant’ jest odmianą o atrakcyjnych, smacznych i mało podatnych na pęknięcie owocach. Zdobywa popularność w sadach niemieckich. Jego przydatność do uprawy w Polsce jest badana.

'MERLA'

Pochodzenie: siewka odmiany 'Merton Late'

Miejsce wyhodowania: Anglia

Drzewo: rośnie stosunkowo słabo, nawet jeśli jest szczepione na siewkach czereśni ptasiej. Tworzy dość luźną, rozłożystą koronę. Pędy jednoroczne umiarkowanie grube, pokryte średnio licznymi przetchlinkami. Antocyjanowe zabarwienie wierzchołka umiarkowanie silne.



Liść błyszczący, średniej długości i szerokości, osadzony na długim ogonku. Drzewo wczesnie wchodzi w okres owocowania, plonuje obficie i corocznie. Jest wytrzymałe na mróz i mało podatne na choroby.

Zapylacze: 'Vega', 'Kunzego', 'Burlat'



Owoc: średniej wielkości o masie 6,5-7,2 g, sercowaty. Skórka jest żółta, ale dużą jej powierzchnię pokrywa piękny, karminowy rumieniec. Miąższ kremowożółty, miękki, i bardzo smaczny. Sok bezbarwny. Pestka średniej wielkości, wydłużona. Szypułka średnio długa, najczęściej ok. 40 mm, średnio gruba.

Zbiór owoców: w czwartym tygodniu dojrzewania czereśni.

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała

Wrażliwość owoców na pękanie: mała

Właściwości użytkowe: Odmiana wybitnie deserowa o bardzo smacznych owocach. Ze względu na słaby wzrost drzew i małą wrażliwość na choroby jest przydatna na działki. Możliwość jej uprawy towarowej jest ograniczona ze względu na zbyt miękkie owoce, które źle znoszą transport.

'MERTON PREMIER'


Pochodzenie: 'Emperor Francis' x 'Bedford Prolific'

Miejsce wyhodowania: Anglia

Drzewo: rośnie średnio silnie, tworzy kulistą koronę o niezbyt silnej konstrukcji i gałęziach wzniesionych ku górze. Pędy jednoroczne umiarkowanie grube, pokryte średnio licznymi przetchlinkami. Liść długi i średnio szeroki, osadzony na średnio długim ogonku, młodniki ciemnoczerwone. Drzewo wcześnie wchodzi w okres owocowania, owocuje obficie i regularnie. Jest średnio wrażliwe na mróz.



Zapylacze: 'Burlat', 'Vega'



Owoc: średniej wielkości o masie około 5,0 g, kulisty lub lekko wydłużony. Skórka ciemnopurpurowa z licznymi drobnymi przetchlinkami, a w pełnej dojrzałości owocu prawie czarna. Miąższ czerwony, średnio ścisły, soczysty, słodki. Pestka mała, prawie kulista. Szypułka średniej długości, dość sztywna.

Zbiór owoców: w końcu trzeciego lub na początku czwartego tygodnia dojrzewania czereśni, przeważnie w końcu czerwca.

Wrażliwość na raka bakteryjnego: odmiana odporna

Wrażliwość owoców na pękanie: mała

Właściwości użytkowe: Odmiana odporna na raka bakteryjnego. Przydatna szczególnie do uprawy amatorskiej. Do sadów towarowych jest mniej polecana, ponieważ owoce są zaledwie średniej wielkości.

‘NEW YORK 980.1’

Pochodzenie: prawdopodobnie siewka odmiany ‘Schneidera Późna’

Miejsce wyhodowania: USA

Drzewo: rośnie silnie. Tworzy kształtną koronę o dość mocnej konstrukcji z dolnymi gałęziami zwisającymi ku dołowi. Pędy jednoroczne umiarkowanie grube. Liść średniej długości i szerokości, osadzony na długim ogonku, miodniki jasnoczerwone. Drzewo wcześnie wchodzi w okres owocowania i obficie plonuje. Jest dość wrażliwe na mróz.



Zapylacze: ‘Büttnera Czerwona’, ‘Hedelfińska’



Owoc: duży, lub bardzo duży o masie 7,5 - 8,5 g, ale nierzadko osiągający masę 10 g. , nerkowaty, wyraźnie ścięty na wierzchołku. Skórka ciemnoczerwona, a w pełnej dojrzałości prawie czarna. Miąższ ciemnoczerwony, chrząstkowaty, soczysty, winno-słodki, smaczny. Pestka średniej wielkości, kulista. Szypułka dość długa i gruba.

Zbiór owoców: na początku szóstego tygodnia dojrzewania czereśni, kilka dni przed odmianą ‘Büttnera Czerwona’

Wrażliwość na raka bakteryjnego: średnia

Wrażliwość owoców na pękanie: duża

Właściwości użytkowe: Czereśnia o bardzo ładnych, smacznych owocach. Jej przydatność do szerokiej uprawy ogranicza mała wytrzymałość drzew na mróz i wysoka podatność owoców na pękanie.

‘NEWSTAR’

(syn. ‘New Star’)

Pochodzenie: ‘Van’ x ‘Stella’

Miejsce wyhodowania: Summerland, Kanada

Drzewo: rośnie średnio silnie. Tworzy kształtną, dobrze rozgałęzioną koronę. Pędy jednoroczne umiarkowanie grube, pokryte średnio licznymi przetchlinkami. Liść średniej długości i szerokości, osadzony na średnio długim ogonku, miodniki jasnoczerwone. Drzewo wcześnie wchodzi w okres owocowania. Plonuje regularnie i obficie.



Zapylacze: odmiana samopłodna

Owoc: duży lub bardzo duży, o średniej masie 8,5 - 9,5 g, nerkowaty. Skórka purpurowoczerwona, błyszcząca. Miąższ ciemnoczerwony, słodki i soczysty. Pestka mała, owalna. Szypułka średniej długości, najczęściej około 40 mm, dość cienka.

Zbiór owoców: w końcu piątego lub na początku szóstego tygodnia dojrzewania czereśni.

Wrażliwość na raka bakteryjnego: w toku badań

Wrażliwość owoców na pękanie: duża

Właściwości użytkowe: Nowa wielkoowocowa i samopłodna odmiana czereśni, ale przydatna głównie na działki. Jej przydatność do uprawy towarowej ogranicza duża podatność owoców na pękanie i gnicie.

'OKTAVIA'


Pochodzenie: 'Schneidera Późna' x 'R 57/35'

Miejsce wyhodowania: Niemcy

Drzewo: rośnie średnio silnie. Tworzy zagęszczoną koronę z dużą liczbą drobnych gałęzi. Pędy jednoroczne umiarkowanie grube, pokryte średnio licznymi przetchlinkami. Liść średniej długości i szerokości, osadzony na średnio długim ogonku, miodniki pomarańczowożółte. Drzewo wcześnie wchodzi w okres owocowania i dość dobrze plonuje. Jest wytrzymałe na mróz.



Zapylacze: 'Sam', 'Schneidera Późna'



Owoc: duży o masie 8,0 – 9,0 g, owalny, lekko asymetryczny. Skórka mahoniowoczerwona, a w pełnej dojrzałości prawie czarna. Miąższ ciemnoczerwony, chrząstkowaty, smaczny. Sok bordowoczerwony. Pestka stosunkowo duża, wydłużona. Szypułka długa (50-55 mm), średniej grubości, jasnozielona.

Zbiór owoców: pod koniec szóstego lub na początku siódmego tygodnia dojrzewania czereśni. Owoce dojrzewają nierównomiernie.

Wrażliwość na raka bakteryjnego: w toku badań

Wrażliwość owoców na pękanie: średnia

Właściwości użytkowe: 'Octavia' jest przydatna do uprawy towarowej w Polsce, ale pod względem jakości owoców nie dorównuje takim odmianom jak: 'Sylvia', 'Kordia' czy 'Regina'.

‘POLA’

Pochodzenie: siewka z wolnego zapylenia odmiany ‘Schneidera Późna’

Miejsce wyhodowania: ISK Skierniewice, Polska

Drzewo: rośnie średnio silnie lub silnie, zależnie od rodzaju gleby i podkładki. Tworzy kulistą, bardzo kształtną koronę z szerokimi kątami rozwidleń. Pędy jednoroczne umiarkowanie grube, pokryte średnio licznymi przetchlinkami.

Liść długi i średnio szeroki, osadzony na średnio długim ogonku, miódniki pomarańczowożółte. Drzewo wcześnie wchodzi w okres owocowania, owocuje obficie i regularnie. Jest mało podatne na mróz.



Zapylacze: ‘Van’, ‘Vega’, ‘Sam’, ‘Büttnera Czerwona’.



Owoc: duży o masie 8,0 - 9,0 g, szerokokoscowaty. Skórka ciemnoczerwona, z odcieniem brązu. Miąższ ciemnoczerwony, ciemniejszy przy pestce, chrząstkowaty, soczysty, smaczny. Sok czerwony lub ciemnoczerwony. Pestka średniej wielkości, kulista. Szypułka średnio długa, ok. 40 mm, umiarkowanie gruba.

Zbiór owoców: w szóstym tygodniu dojrzewania czereśni.

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała

Wrażliwość owoców na pękanie: mała

Właściwości użytkowe: ‘Pola’ jest atrakcyjną, późną odmianą czereśni o ciemnoczerwonych owocach. Można ją wybierać do uprawy zwłaszcza w rejonach charakteryzujących się większą ilością opadów w czerwcu i lipcu.

'RAINIER'

Pochodzenie: 'Bing' x 'Van'

Miejsce wyhodowania: USA

Drzewo: rośnie dość silnie. Tworzy koronę o mocnej konstrukcji z konarami wzniesionymi ku górze i obficie obłożonymi krótkopędami. Pędy jednoroczne umiarkowanie grube, pokryte średnio licznymi przetchlinkami. Liść średniej długości i szerokości, osadzony na krótkim ogonku, miodniki pomarańczowożółte. Drzewo średnio wcześnie wchodzi w okres owocowania i owocuje dość obficie. Jest mało wrażliwe na mróz.



Zapylacze: 'Van', 'Napoleona', 'Ulster', 'Sam', 'Bing'



Owoc: duży o średniej masie 7,5-8,5 g, szerokokoscowaty. Skórka jasnożółta, w pełnej dojrzałości owocu pokryta jaskrawoczerwonym rumieńcem. Miąższ kremowy, chrząstkowaty, soczysty, słodki, bardzo smaczny. Sok bezbarwny. Pestka średniej wielkości, okrągła. Szypułka dość krótka, długości ok. 35 mm, średnio gruba.

Zbiór owoców: w szóstym tygodniu dojrzewania czereśni

Wrażliwość na raka bakteryjnego: duża

Wrażliwość na pęknięcie: średnia

Właściwości użytkowe: Atrakcyjna odmiana o jasnych i bardzo smacznych owocach. W przeciwieństwie do innych czereśni o jasnym zabarwieniu skórki jej owoce dobrze znoszą transport. Odmiana dobrze plonująca w polskich warunkach klimatycznych, ale jej przydatność do uprawy ogranicza duża podatność drzew na raka bakteryjnego.

‘RANNAJA ROZOVINKA’

Pochodzenie: ‘Drogana Żółta’ x ‘Skorospielka’


Miejsce wyhodowania: Donieck, Ukraina

Drzewo: rośnie średnio silnie. Tworzy rozłożystą, średnio zagęszczoną koronę. Pędy jednoroczne umiarkowanie grube, pokryte średnio licznymi przetchlinkami. Liść średnio długi i średnio szeroki, osadzony na krótkim ogonku, miodniki pomarańczowożółte. Drzewo



jest wytrzymałe na mróz. Kwitnie średnio wcześnie, wcześnie wchodzi w okres owocowania i obficie, corocznie plonuje.

Zapylacze: będą badane



Owoc: średniej wielkości o masie ok. 5,0 g, kulisty, lekko spłaszczony na wierzchołkach. Skórka żółta z delikatnym cynobrowym rumieńcem. Miąższ kremowobiały, smaczny, średnio soczysty. Sok bezbarwny. Pestka średniej wielkości, okrągła. Szypułka średnio długa, 40-45 mm, dość gruba.

Zbiór owoców: w końcu pierwszego tygodnia dojrzewania czereśni.

Wrażliwość na raka bakteryjnego: średnia

Wrażliwość owoców na pęknięcie: bardzo duża

Właściwości użytkowe: Jasnoowocowa odmiana czereśni o bardzo wczesnym terminie dojrzewania. Jej wartość gospodarcza w warunkach Polski jest badana. Wydaje się jednak, że nie znajdzie większego uznania, ponieważ jej owoce są bardzo podatne na pęknięcie i gnienie oraz odgniecenia w czasie transportu.

'REGINA'

Pochodzenie: 'Schneidera Późna' x 'Rube'

Miejsce wyhodowania: Niemcy

Drzewo: rośnie średnio silnie. Tworzy kształtną, średnio zagęszczoną koronę z wyraźnie zaznaczającym się przewodnikiem. W owocowanie wchodzi średnio wcześnie, owocuje dość regularnie, umiarkowanie obficie. Jest średnio wrażliwe na mróz i mało podatne na choroby.

Zapylacze: 'Sam', 'Schneidera Późna', 'Bianca', 'Hedelfińska', 'Sylvia'.



Owoc: duży lub bardzo duży, o średniej masie 8,0 - 9,0 g, a w sprzyjających warunkach osiąga masę powyżej 10 g. Kształt szerokosercowaty, niekiedy wydłużony. Skórka ciemnoczerwona, błyszcząca. Miąższ jasnoczerwony, chrząstkowaty, soczysty i smaczny. Pestka mała lub średnia, wydłużona. Szypułka długa, dość gruba, zielona.

Zbiór owoców: w siódmym tygodniu dojrzewania czereśni, kilka dni po odmianie 'Hedelfińska'. Można je dłużej przetrzymać na drzewie.

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała

Wrażliwość owoców na pęknięcie: mała

Właściwości użytkowe: Stosunkowo nowa, interesująca odmiana czereśni o bardzo późnej porze dojrzewania owoców. Jej owoce są mało podatne na pęknięcie, dobrze znoszą transport i mają dużą wartość handlową.

'RIVAN'

Pochodzenie: 'Annonay' x 'Wczesna Riversa'

Miejsce wyhodowania: Szwecja

Drzewo: rośnie umiarkowanie silnie. Pędy jednoroczne średnio grube, pokryte nielicznymi przetchlinkami. Liść średniej długości i szerokości, osadzony na średnio długim ogonku, miodniki ciemnoczerwone. Drzewo wcześnie wchodzi w owocowanie, plonuje dobrze, corocznie. Jest wytrzymałe na mróz, a kwiaty są mało wrażliwe na przymrozki.



Zapylacze: 'Vega', 'Burlat'



Owoc: średniej wielkości o masie 4,5-5,5 g, sercowaty. Skórka ciemnoczerwona, lśniąca, a w pełnej dojrzałości prawie czarna. Miąższ ciemnoczerwony, lekko chrząstkowaty, winnosłodki, smaczny. Pestka mała, wydłużona, ostro zakończona. Szypułka dość długa, około 50 mm, cienka.

Zbiór owoców: w pierwszym tygodniu dojrzewania czereśni, najczęściej na przełomie maja i czerwca. Owoce trzeba zbierać dwukrotnie. Nie należy ich zbierać zbyt wcześnie.

Wrażliwość na raka bakteryjnego: średnia do małej

Wrażliwość owoców na pęknięcie: średnia

Właściwości użytkowe: Odmiana o najwcześniej dojrzewających owocach, polecana do sadów towarowych i do uprawy amatorskiej.

‘SCHNEIDERA PÓŻNA’

(syn. ‘Kozerska’, ‘Kasztany’, ‘Kasztanioki’)

Pochodzenie: nieznane

Miejsce wyhodowania: Niemcy

Drzewo: rośnie bardzo silnie. Tworzy potężną szerokostożkowatą, luźną koronę. Pędy jednoroczne umiarkowanie grube, pokryte dość licznymi przetchlinkami. Liść średniej długości i szerokości, osadzony na średnio długim ogonku, miodniki jasnoczerwone. Drzewo średnio



wcześnie wchodzi w owocowanie i plonuje umiarkowanie obficie. Jest średnio wrażliwe na mróz, ale pąki kwiatowe są wrażliwe na przymrozki wiosenne.

Zapylacze: ‘Hedelfińska’, ‘Kunzego’, ‘Van’



Owoc: duży lub bardzo duży o masie 8,0 -9,0 g, szerokosercowaty. Skórka wiśniowobrazowa, a w pełnej dojrzałości brązowoczarna, lśniąca. Miąższ jasnoczerwony, chrząstkowaty, słodko-winny, bardzo smaczny. Pestka średniej wielkości, wydłużona, o licach jajowatych. Szypułka dość długa, około 45-50 mm, raczej wiotka.

Zbiór owoców: pod koniec szóstego tygodnia dojrzewania czereśni.

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała

Wrażliwość owoców na pęknięcie: średnia

Właściwości użytkowe: Odmiana wybitnie deserowa o wyjątkowo smacznych i dorodnych owocach, dobrze znoszących transport. Jest jednak dość zawodna w plonowaniu. Przydatna do sadów amatorskich oraz towarowych zwłaszcza w cieplejszych rejonach kraju, gdzie nie występują późnowiosenne przymrozki.

‘STARK HARDY GIANT’

(syn. ‘Starking Hardy Giant’)

Pochodzenie: siewka nieznanego pochodzenia

Miejsce wyhodowania: Wisconsin, USA

Drzewo: rośnie silnie. Tworzy dość luźną, rozłożystą koronę. Pędy jednoroczne umiarkowanie grube, pokryte średnio licznymi przetchlinkami. Liść średniej długości i szerokości, osadzony na krótkim ogonku,



miodniki pomarańczowożółte. Drzewo wcześnie wchodzi w okres owocowania, plonuje regularnie i obficie. Jest dość wytrzymałe na mróz i średnio wrażliwe na choroby.

Zapylacze: ‘Büttnera Czerwona’, ‘Hedelfińska’, ‘Burlat’, ‘Rainier’



Owoc: duży o średniej masie 7,5 – 8,0 g. Kształt sercowaty, na wierzchołku tępo zakończony. Skórka ciemnoczerwona z odcieniem brązowym. Miąższ czerwony, ciemniejszy przy pestce, chrząstkowaty, soczysty, bardzo smaczny. Sok ciemnoczerwony. Pestka mała, kulista, lekko spłaszczona. Szypułka dość długa i cienka.

Zbiór owoców: w szóstym tygodniu dojrzewania czereśni.

Wrażliwość na raka bakteryjnego: średnia

Wrażliwość owoców na pękanie: średnia do dużej

Właściwości użytkowe: Późna odmiana czereśni o smacznych i bardzo atrakcyjnych owocach. Jej przydatność do nasadzeń towarowych w Polsce obniża dość duża podatność owoców na pękanie.

'STELLA'

Pochodzenie: 'Lambert' x siewka 'John Innes 2420'

Miejsce wyhodowania: Summerland, Kanada

Drzewo: rośnie średnio silnie lub słabo. Tworzy zwartą koronę o wzniesionych ku górze konarach. Pędy jednoroczne umiarkowanie grube, pokryte średnio licznymi przetchlinkami. Liść średniej długości i szerokości, osadzony na



średnio długim ogonku, miodniki pomarańczowożółte. Drzewo wcześnie wchodzi w okres owocowania, owocuje dość obficie, corocznie. Jest mało wytrzymałe na mróz.

Zapylacze: odmiana samopłodna.



Owoc: duży lub bardzo duży o średniej masie 7,5-8,5 g. Kształt sercowaty, wydłużony. Skórka początkowo jaskrawoczerwona, a w pełnej dojrzałości ciemnoczerwona, błyszcząca. Miąższ ciemnoczerwony, chrząstkowaty, soczysty, smaczny. Sok czerwony. Pestka średniej wielkości, wydłużona. Szypułka średniej długości, gruba.

Zbiór owoców: w szóstym tygodniu dojrzewania czereśni.

Wrażliwość na raka bakteryjnego: duża

Wrażliwość owoców na pęknięcie: duża

Właściwości użytkowe: Późna odmiana czereśni o owocach wysokiej jakości. Pierwsza odmiana samopłodna. Przydatna do ogrodów działkowych. Wprowadzenie jej do szerszej uprawy ogranicza duża wrażliwość drzew na raka bakteryjnego, mała wytrzymałość na mróz i podatność owoców na pęknięcie.

'SUMMIT'

Pochodzenie: 'Van' x 'Sam'

Miejsce wyhodowania: Summerland, Kanada

Drzewo: rośnie silnie. Tworzy kształtną koronę o średnio silnej konstrukcji. Pędy jednoroczne średnio grube, pokryte nielicznymi przetchlinkami. Liść długi i średnio szeroki, osadzony na średnio długim ogonku, miodniki jasnoczerwone. Drzewo wczesnie wchodzi w okres owocowania, plonuje regularnie i obficie. Jest wytrzymałe na mróz i mało podatne na choroby.



Zapylacze: 'Van', 'Lapins', 'Hedelfińska', 'Bing', 'Lambert'



Owoc: bardzo duży o masie 9,0 – 10,0 g, szerokokoscowaty. Skórka jaskrawoczerwona, błyszcząca, a w pełnej dojrzałości ciemnoczerwona. Miąższ jasnoczerwony, chrząstkowaty, soczysty, bardzo smaczny. Sok czerwony. Pestka średniej wielkości, owalna, pękata. Szypułka średniej długości, średnio gruba.

Zbiór owoców: w szóstym tygodniu dojrzewania czereśni.

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała

Wrażliwość owoców na pęknięcie: średnia

Właściwości użytkowe: Nowa odmiana czereśni o pięknych i smacznych owocach. Zdobywa coraz większą popularność w Europie, w tym zwłaszcza we Francji i we Włoszech. W Polsce dość często występuje problem z silnym osypywaniem się zawiązków tej odmiany, co ma niekorzystny wpływ na plonowanie.

‘TECHLOVAN’

Pochodzenie: ‘Van’ x ‘Kordia’

Miejsce wyhodowania: Czechy

Drzewo: rośnie średnio silnie. Tworzy kulistą, średnio zagęszczającą się koronę. Poszczególne gałęzie są licznie obłożone krótkopędami owoconośnymi. Pędy jednoroczne grube, pokryte dużą liczbą przetchlinek. Liść długi i szeroki, osadzony na średnio długim ogonku, miodniki jasnoczerwone. Drzewo bardzo wczesnie wchodzi w okres owocowania, owocuje dobrze i regularnie. Wytrzymałość na mróz i podatność na choroby średnia.

Zapylacze: ‘Stella’, ‘Oktavia’



Owoc: duży do bardzo dużego o średniej masie około 9,0 g, kulistosercowaty. Skórka średniej grubości, ciemnoczerwona, błyszcząca. Miąższ ciemnoczerwony z jasnymi żyłkami, twardy, soczysty i bardzo smaczny. Pestka średniej wielkości, lekko wydłużona. Szypułka dość krótka, najczęściej o długości 30-35 mm, średnio gruba.

Zbiór owoców: w piątym tygodniu dojrzewania czereśni

Wrażliwość na raka bakteryjnego: średnia

Wrażliwość owoców na pęknięcie: duża

Właściwości użytkowe: ‘Techlovan’ to odmiana czereśni o wyjątkowo atrakcyjnych i smacznych owocach. Ich wartość obniża jednak bardzo duża podatność na pęknięcie. Przydatna do nasadzeń na karłowatych podkładkach z pełną ochroną drzew przed ptakami i deszczem.

'ULSTER'

Pochodzenie: 'Schmidt' x 'Lambert'

Miejsce wyhodowania: Geneva, USA

Drzewo: rośnie średnio silnie. Tworzy niewielką i bardzo kształtną koronę z szerokimi kątami rozwidleń. Pędy jednoroczne umiarkowanie grube, pokryte średnio licznymi przetchlinkami. Drzewo jest wyjątkowo obficie ulistnione. Liść średniej długości i szerokości, ciemnozielony z charakterystycznym niebieskawym odcieniem, ogonek liściowy średniej długości, miodniki pomarańczowożółte. Drzewo wczesnie wchodzi w okres owocowania, owocuje regularnie i obficie. Jest wytrzymałe na mróz i mało podatne na choroby.



Zapylacze: 'Sam', 'Vega', 'Van', 'Hedelfińska'.



Owoc; średniej wielkości o masie 6.5-7,0 g, sercowate. Skórka ciemnoczerwona, lśniąca. Miąższ czerwony, intensywniej zabarwiony przy pestce, chrząstkowaty, soczysty, smaczny. Sok czerwony. Pestka dość duża, wydłużona. Szypułka średniej długości ok. 35 mm, średnio gruba.

Zbiór owoców: w piątym tygodniu dojrzewania czereśni

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała

Wrażliwość owoców na pęknięcie: średnia

Właściwości użytkowe: Czereśnia o średniej porze dojrzewania owoców. Cenna z powodu średniej siły wzrostu i wysokiej zdrowotności drzew. Przydatna do sadów towarowych oraz na działki zwłaszcza w rejonach o dużej ilości opadów.

‘VALESKA’

Pochodzenie: ‘Rube’ x ‘Stickmanns Bunte’

Miejsce wyhodowania: Niemcy

Drzewo: rośnie średnio silnie. Tworzy niewielką, kształtną koronę z szerokimi kątami rozwidleń. Pędy jednoroczne umiarkowanie grube, pokryte średnio licznymi przetchlinkami. Liść długi i średnio szeroki, osadzony na średnio długim ogonku, miodniki pomarańczowożółte. Drzewo średnio wcześnie wchodzi w okres owocowania, owocuje regularnie i dość obficie. Jest wytrzymałe na mróz i mało podatne na choroby.



Zapylacze: ‘Vega’, ‘Büttnera Czerwona’



Owoc: średniej wielkości o masie 6,0 – 6,5 g, sercowaty. Skórka wiśniowoczerwona, z połyskiem. Miąższ jasnoczerwony, intensywniej zabarwiony przy pestce, chrząstkowaty, soczysty, bardzo smaczny. Sok jasnoczerwony. Pestka średniej wielkości, wydłużona. Szypułka średniej długości, lekko ordzawiona.

Zbiór owoców: w czwartym tygodniu dojrzewania czereśni

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała do średniej

Wrażliwość owoców na pękanie: mała

Właściwości użytkowe: ‘Valeska’ jest interesującą odmianą ze względu na dużą wytrzymałość drzew na mróz, małą wrażliwość na choroby i małą podatność owoców na pękanie. Przydatna do uprawy amatorskiej. Do sadów towarowych jest mniej polecana, ponieważ pod względem wielkości owoców ustępuje miejsca innym czereśniom dojrzewającym w podobnym terminie m.in. odmianie ‘Vanda’.

'VAN'


Pochodzenie: nieznane

Miejsce wyhodowania: Summerland, Kanada

Drzewo: rośnie średnio silnie, tworzy luźną, kulistą koronę o sztywnych, grubych gałęziach. Pędy jednoroczne średnio grube, pokryte nielicznymi przetchlinkami. Liść średniej długości i szerokości, osadzony na średnio długim ogonku, miódniki jasnoczerwone. Drzewo wcześnie wchodzi w okres owocowania, owocuje obficie i regularnie. Pąki kwiatowe są rzadko uszkodzane przez wiosenne przymrozki.



Zapylacze: 'Büttnera Czerwona', 'Hedelfińska', 'Kordia', 'Starking Hardy Giant', Rainier'



Owoc: duży o średniej masie 7,0-8,0 g, szerokosercowaty lub kulisty. Skórka średniej grubości, jasnoczerwona, a w pełnej dojrzałości ciemnoczerwona, lśniąca. Miąższ twardy, chrząstkowaty, soczysty, bardzo smaczny. Pestka mała, kulista, pękata. Szypułka krótka, około 30 mm długości, dość gruba.

Zbiór owoców: w końcu piątego lub na początku szóstego tygodnia dojrzewania czereśni.

Wrażliwość na raka bakteryjnego: duża

Wrażliwość owoców na pękanie: duża

Właściwości użytkowe: 'Van' jest odmianą o atrakcyjnych i bardzo smacznych owocach. Uprawiany jest powszechnie m.in. w Norwegii i we Włoszech. Duża wrażliwość drzew na choroby, a w szczególności na raka bakteryjnego oraz wysoka podatność owoców na pękanie ogranicza możliwości szerokiej uprawy tej odmiany w Polsce.

‘VANDA’

Pochodzenie: ‘Van’ x ‘Kordia’

Miejsce wyhodowania: Czechy

Drzewo: rośnie średnio silnie lub słabo.

W młodości tworzy koronę kulistą, a późniejszym okresie - bardziej rozłożystą i zagęszczoną. Pędy jednoroczne średnio grube, pokryte nielicznymi przetchlinkami. Liść długi i średnio szeroki, osadzony na średnio długim ogonku, miodniki



pomarańczowożółte. Drzewo bardzo wcześnie wchodzi w okres owocowania i bardzo dobrze plonuje. Jest wytrzymałe na mróz i średnio wrażliwe na choroby. Kwitnie średnio wcześnie.

Zapylacze: ‘Stella’, ‘Summit’, ‘Rainier’



Owoc: duży o masie 7,0-8,0 g. Kształt kulisty, spłaszczony na wierzchołku. Skórka ciemnoczerwona, błyszcząca, a w pełnej dojrzałości mahoniowa z odcieniem brązowym. Miąższ czerwony, zwarty, chrząstkowaty, bardzo smaczny. Sok czerwony. Pestka średniej wielkości, kulista. Szypułka średniej długości, zielona.

Zbiór owoców: na przełomie czwartego i piątego tygodnia dojrzewania czereśni.

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała do średniej

Wrażliwość owoców na pęknięcie: mała

Właściwości użytkowe: Bardzo wartościowa odmiana w polskich warunkach klimatycznych. Jej podstawowym atutem jest bardzo dobra plenność, niezawodność w owocowaniu i wysoka jakość owoców.

‘VEGA’

Pochodzenie: ‘Bing’ x ‘Victor’

Miejsce wyhodowania: Kanada

Drzewo: rośnie silnie, zwłaszcza w pierwszych latach po posadzeniu. Tworzy luźną koronę o mocnej konstrukcji ze sztywnymi konarami wzniesionymi ku górze. Jest wytrzymałe na mróz i mało podatne na choroby. Pędy jednoroczne grube, pokryte średnio licznymi przetchlinkami. Liść średniej długości i szerokości, osadzony na krótkim ogonku, miodniki pomarańczowożółte. Drzewo wczesnie wchodzi w okres owocowania, owocuje obficie i regularnie. Jest wytrzymałe na mróz.



Zapylacze: ‘Karesova’, ‘Büttnera Czerwona’, ‘Hedelfińska’



Owoc: duży o masie 7,5-8.5 g, szerokosercowaty. Skórka jasnożółta, pokryta karminowym rumieńcem. Miąższ jasnożółty, soczysty, chrząstkowaty, bardzo smaczny. Sok bezbarwny. Pestka średniej wielkości, prawie kulista. Szypułka krótka, ok. 30 -35 mm długości, średniej grubości, zielona, najczęściej lekko ordzawiona.

Zbiór owoców: przełom czwartego i piątego tygodnia dojrzewania czereśni, przeważnie w pierwszej dekadzie lipca. Można je dłużej przetrzymać na drzewie, ponieważ nie mięknią, a poprawia się ich wybarwienie i smak. Nie należy jednak opóźniać zbioru w czasie deszczowej pogody, gdyż owoce masowo pękają i gniją.

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała

Wrażliwość owoców na pęknięcie: średnia lub duża

Właściwości użytkowe: Odmiana deserowa i przetwórcza przydatna do intensywnych sadów czereśniowych, a także do nasadzeń amatorskich. Jej wadą jest dość duża podatność owoców na pęknięcie i jeszcze większa na moniliozę.

‘VICTOR’

Pochodzenie: siewka z wolnego zapylenia czereśni ‘Windsor’

Miejsce wyhodowania: Vineland, Kanada

Drzewo: rośnie silnie. W pierwszych kilku latach po posadzeniu tworzy zwartą, jajowatą koronę, która później staje się bardziej rozłożysta. Konary wzniesione ku górze. Pędy jednoroczne średnio grube, pokryte nielicznymi przetchlinkami. Liść długi i średnio szeroki, osadzony na średnio długim ogonku, miodniki pomarańczowożółte. Drzewo wczesnie wchodzi w okres owocowania i obficie, corocznie plonuje. Jest dostatecznie wytrzymałe na mróz.



Zapylacze: ‘Büttnera Czerwona’, ‘Hedelfińska’



Owoc: średniej wielkości o masie 6,5 - 7,5 g, szerokokoscowaty. Skórka jasnożółta, lśniąca, pokryta karminowym rumieńcem. Miąższ jasnożółty, dość ścisły, lekko kwaśny, smaczny. Pestka średniej wielkości, owalna. Szypułka średniej długości, najczęściej około 35-40 mm, średnio gruba.

Zbiór owoców: w końcu piątego tygodnia dojrzewania czereśni, kilka dni przed odmianą ‘Sam’.

Wrażliwość na raka bakteryjnego: średnia

Wrażliwość owoców na pękanie: średnia

Właściwości użytkowe: Dość interesująca średnio późna odmiana czereśni o jasnych owocach. Przydatna głównie do uprawy amatorskiej. Jej przydatność do uprawy towarowej ogranicza duża wrażliwość owoców na transport.

‘VIOLA’

Pochodzenie: ‘Schneidera Późna’ x ‘R 57/188’

Miejsce wyhodowania: Jork, Niemcy

Drzewo: rośnie umiarkowanie silnie. Tworzy dość gęstą, obficie ulistnioną koronę. Pędy jednoroczne średniej grubości, pokryte umiarkowaną liczbą przetchlinek. Liść średniej długości i szerokości, osadzony na długim ogonku, miodniki



pomarańczowożółte. Drzewo wcześnie wchodzi w okres owocowania i średnio dobrze plonuje. Kwitnie późno, dzięki czemu pąki kwiatowe są rzadko uszkodzane przez wiosenne przymrozki. Wytrzymałość drzew na mróz jest badana.

Zapylacze: ‘Sam’, ‘Schneidera Późna’, ‘Alma’, ‘Anabella’, ‘Rube’



Owoc: średniej wielkości o masie 6,5 – 8,0 g, szerokokoscowaty. Skórka ciemnomahoniowa, błyszcząca. Miąższ czerwony, chrząstkowaty, dość smaczny. Pestka średniej wielkości, wydłużona. Szypułka średniej długości, zielona.

Zbiór owoców: w siódmym tygodniu dojrzewania czereśni.

Wrażliwość na raka bakteryjnego: jest badana

Wrażliwość owoców na pęknięcie: mała/średnia

Właściwości użytkowe: Dość interesująca odmiana w warunkach klimatyczno-glebowych Polski. Jej owoce ustępują jednak jakością innym, późno dojrzewającym odmianom takim jak: ‘Sylvia’, ‘Kordia’, ‘Karina’ czy ‘Regina’.

‘VISTA’


Pochodzenie: ‘Hedelfińska’ x ‘Victor’

Miejsce wyhodowania: Vineland, Kanada

Drzewo: rośnie średnio silnie. Pędy jednoroczne średnio grube, pokryte licznymi przetchlinkami. Liść długi i szeroki, osadzony na długim ogonku, miodniki jasnoczerwone. Drzewo wczesnie wchodzi w okres owocowania i obficie, corocznie plonuje. Jest średnio wytrzymałe na mróz.



Zapylacze: ‘Burlat’, ‘Napoleona’



Owoc: średniej wielkości o masie 6,0-6,5 g, szerokokosercowaty. Skórka ciemnoczerwona, błyszcząca. Miąższ jasnoczerwony, z ciemniejszymi żyłkami, intensywniej zabarwiony przy pestce, średnio ścisły, bardzo smaczny. Pestka średniej wielkości, lekko wydłużona. Szypułka dość długa i średnio gruba.

Zbiór owoców: na przełomie trzeciego i czwartego tygodnia dojrzewania czereśni, kilka dni po owocach odmiany ‘Burlat’

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała

Wrażliwość owoców na pękanie: mała do średniej

Właściwości użytkowe: Interesująca odmiana czereśni ze względu na smaczne, ciemnoczerwone owoce i wczesny termin ich dojrzewania. Pod względem wielkości owoców ustępuje jednak innym odmianom dojrzewającym w podobnym terminie.

‘WALERIJ CZKAŁOW’

Pochodzenie: wolne zapylenie odmiany ‘Rozowaja’

Miejsce wyhodowania: odmiana rosyjsko-ukraińska

Drzewo: rośnie silnie. Początkowo tworzy piramidalną koronę o konarach wzniesionych pionowo do góry, ale po wejściu w okres owocowania korona staje się rozłożysta. Pędy jednoroczne średniej grubości, pokryte średnio licznymi przetchlinkami. Liść długi i szeroki, osadzony na średnio długim ogonku, miodniki jasnoczerwone. Drzewo plonuje dość regularnie, ale średnio obficie. Jest dość wytrzymałe na mróz.



Zapylacze: ‘Vega’, ‘Marchijska’, ‘Jaboulay’

Owoc: średniej wielkości o masie 6,0 – 7,0 g, kulistosercowate. Skórka ciemnoczerwona, lśniąca, w pełnej dojrzałości prawie czarna. Miąższ ciemnoczerwony, średnio jędrny, soczysty, smaczny. Pestka średniej wielkości, pękata. Szypułka dość długa i gruba.

Zbiór owoców: w trzecim tygodniu dojrzewania czereśni.

Wrażliwość na raka bakteryjnego: mała

Wrażliwość owoców na pęknięcie: średnia do dużej

Właściwości użytkowe: odmiana przydatna głównie do sadów przydomowych.