

'AUERBACHER'

Synonimy

'Krutf I', 'Johannisberg I', 'Köpflizwetsche',
'Rafzerzwetsche'

Pochodzenie

Niemcy



Fot. Agnieszka Głowacka

Rodowód

Nieznany

Drzewo

Rośnie silnie i tworzy kulistą koronę z krótkimi pędami owoconośnymi. Wcześniej wchodzi w okres owocowania, plonuje dobrze i zwykle regularnie.

Zapyłacze

Odmiana częściowo samopłodna. 'Ersinger', 'Węgierka Zwykła'.

Podatność na choroby

Mała

Wytrzymałość na mróz

Duża

Owoce

Średniej wielkości, o masie ok. 30 g, jajowate. Skórka czerwonofioletowa do ciemnoniebieskiej, z intensywnym nalotem woskowym. Miąższ żółty do żółto-pomarańczowego, soczysty, średnio smaczny. Pestka średniej wielkości, wydłużona, dobrze oddziela się od miąższu.

Termin zbioru

I lub II dekada września.

Owoce dojrzewają nierównomiernie.

Właściwości użytkowe

Odmiana deserowa i przetwórcza

Praca wykonana w ramach Programu Wieloletniego „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, finansowanego przez MRiRW.

Zadanie 1.7 – Poszerzanie różnorodności gatunków i odmian roślin ogrodniczych na obszarach wiejskich oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych.