



'CHARŁAMOWSKA'

Synonimy

'Sierpniówka', 'Borowinka krapczataja',
'Duchess of Oldenburg', 'Charlamowsky'

Pochodzenie

Odmiana rosyjska



Fot. Grzegorz Hodun

Rodowód

Nieznany

Drzewo

Niezbyt duże, korona prawie kulista, lekko się zagęszczająca, z przewieszającymi się pędami. Wchodzenie w owocowanie bardzo wczesne. Obfite plonowanie co drugi rok.

Podatność na choroby

Umiarkowana na parcha jabłoni

Wytrzymałość na mróz

Duża

Owoce

Średniej wielkości, kuliste lekko spłaszczone, białawożółte z dużym, zazwyczaj mocnym, karminowym, marmurkowo-paskowanym rumieńcem. Szypułka umiarkowanie gruba, średniej długości do długiej. Kielich umiarkowanie duży, zamknięty lub półotwarty. Miąższ żółtawobiały, luźny, soczysty, kwaskowaty, aromatyczny.

Dojrzałość zbiorcza

Trzecia dekada sierpnia

Dojrzałość konsumpcyjna

Do dwóch tygodni po zbiorze

Właściwości użytkowe

Owoce do bezpośredniego spożycia i na kompoty

Praca wykonana w ramach Programu Wieloletniego „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, finansowanego przez MRiRW.

Zadanie 1.7 – Poszerzanie różnorodności gatunków i odmian roślin ogrodniczych na obszarach wiejskich oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych.