

'SHIRO'

Synonimy

Brak

Pochodzenie

USA



Fot. Agnieszka Głowacka

Rodowód

Nieznany

Drzewo

Rośnie silnie i tworzy rozłożystą koronę. Wcześnie wchodzi w okres owocowania, plonuje bardzo obficie i regularnie.

Zapylacze

'Santa Rosa', 'Satsuma'

Podatność na choroby

Mała

Wytrzymałość na mróz

Średnia

Owoce

Średniej wielkości, o masie ok. 35 g, ale przy obfitym plonowaniu drobnieją, sercowate. Skórka dość cienka, żółta. Miąższ żółty, średnio jędrny, bardzo soczysty i aromatyczny. Smak zależy od warunków pogodowych i wielkości plonu. Pestka mała owalna, asymetryczna, mocno przylegająca do miąższu.

Termin zbioru

Koniec lipca – początek sierpnia.
Owoce dojrzewają nierównomiernie.

Właściwości użytkowe

Odmiana deserowa i przetwórcza

Praca wykonana w ramach Programu Wieloletniego „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, finansowanego przez MRiRW.

Zadanie 1.7 – Poszerzanie różnorodności gatunków i odmian roślin ogrodniczych na obszarach wiejskich oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych.