

# Najlepsze odmiany *moreli*



■ dr hab. Mirosław Sitarek,  
Instytut Ogrodnictwa  
w Skierniewicach

ROŚNIE ZAINTERESOWANIE UPRAWĄ  
MORELI WE WŁASNYM OGRÓDKU.  
OWOCE TEGO GATUNKU MAJĄ  
WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE,  
A CORAZ ŁAGODNIEJSZY KLIMAT  
W POLSCE SPRZYJA NIEMAL  
COROCZNEMU OWOCOWANIU  
DRZEW.



**SPRZEDAŻ  
WYSYŁKOWA**

[www.dzialkowiecsclep.pl](http://www.dzialkowiecsclep.pl)

Polecamy najlepsze  
odmiany moreli

tel. 22 101 34 34

Sprawdź dostępność!

**W**iększości morele są spożywane na świeżo, ale z powodzeniem wykorzystuje się je także do produkcji dżemów, kompotów, soków, wypieku ciast i wyrobu nalewek. Jednak najważniejszym, oprócz konsumpcji świeżych owoców, sposobem ich wykorzystania jest suszenie. W porównaniu z innymi owocami naszej strefy klimatycznej morele zawierają najwięcej witaminy A i potasu. W krajach europejskich słynących z produkcji moreli na skalę towarową uprawia się około 30 odmian. Wieloletnie obserwacje prowadzone w kolekcji IO w Skierniewicach wskazują, że spośród 100 ocenianych odmian do uprawy amatorskiej w Polsce można polecić tylko kilka – ich drzewa plonują regularnie, a owoce są wysokiej jakości.



1


**1 Dobrzyńska** – drzewo charakteryzuje się silnym wzrostem, tworzy rozłożystą, średnio rozgałęzioną koronę. Owoce są duże (60–70 g), jajowate, o zaokrąglonym wierzchołku. Skórka żółtozielona, gładka, z czerwonym rumieńcem pokrywającym około 30% owocu. Miąższ pomarańczowy, średnio zwięzły, aromatyczny, niezbyt słodki, soczysty, u dojrzałych owoców nieco ciemniejący wokół pestki, smaczny. Owoce dojrzewają nierównomiernie – pierwsze na początku drugiej dekady VII, ale mogą pozostawać znacznie dłużej na drzewie, gdyż długo zachowują jędkość i nie opadają przedwcześnie.

**2 Melitopolska Wczesna** – drzewa rosną silnie, tworzą rozłożyste korony. Są bardzo plenne, dlatego średnia masa owoców zebranych z takich drzew rzadko przekracza 25 g. Owoce są zielonożółte z czerwonym, delikatnie nakrapianym rumieńcem. Miąższ pomarańczowy, zwięzły, mało soczysty, smaczny,

bardzo dobrze odchodzi od pestki. Owoce dojrzewają w końcu pierwszej dekady VII. Podobnie jak u innych odmian wczesnych owoce mogą pękać na wierzchołku i opadać z drzew przed osiągnięciem pełnej dojrzałości.

**3 Orangered** – drzewa rosną średnio silnie, zdrowo, tworząc rozłożyste korony. Owoce są bardzo atrakcyjne, żółtopomarańczowe, z karminowym rumieńcem, delikatnie kropkowanym. Miąższ ciemnopomarańczowy, zwięzły, średnio soczysty, słodki, pyszny. Pestka bardzo dobrze odchodzi od miąższu. Przebiegająca masa owocu to 40 g. Odmiana zasługująca na uwagę ze względu na wysokiej jakości, wykwentne w smaku owoce, nadające się doskonale do bezpośredniego spożycia. W warunkach Polski centralnej owoce dojrzewają w końcu pierwszej dekady VII.

**4 Early Orange** – Jest dobrze przystosowana do warunków naszego klimatu – zarówno drzewo, jak i pąki kwiatowe, są



2



3



4



5



6

Fot. M. Starek

wytrzymałe na niskie temperatury. Drzewo ma charakterystyczną, wzniesioną koronę. Przy braku formowania w młodym wieku, konary odchodzą od przewodnika pod ostrym kątem. Owoce dojrzewają na początku drugiej dekady VII, są kuliste, pomarańczowe, z karminowym rumieńcem od strony nasłonecznionej. Miąższ pomarańczowy, soczysty, smaczny, dobrze odchodzi od pestki. Wielkość owoców zależy od ich ilości na drzewie i wynosi 32–45 g.

**5 Harcot** – odmiana dobrze zaaklimatyzowana. Drzewa rosną umiarkowanie silnie, zdrowo, są plenne. Owoce zwężają się przy szypułce, przypominając gruszkę, dojrzewają w poł. VII. Są chropowate, żółtopomarańczowe, z czerwonym, wyraźnym kropkowanym rumieńcem. Miąższ pomarańczowy, zwięzły, średnio soczysty, bardzo smaczny. Pestka bardzo dobrze odchodzi od miąższu. Owoce dorastają do 55–58 g i nie opadają przedwcześnie z drzew.

**6 Wczesna z Morden** – uprawiana w Polsce od 70 lat. W niektórych rejonach, zwłaszcza na Śląsku, znana pod nazwą „cytrynka”. Jest wytrzymała na niskie temperatury i dobrze znosi trudy naszego klimatu. Drzewa rosną bardzo silnie i tworzą charakterystyczne rozłożyste korony. Owoce są silnie spłaszczone z wyraźnym czubkiem, żółtopomarańczowe, rzadko ze słabym czerwonym rumieńcem. Miąższ pomarańczowy, soczysty, bardzo dobrze odchodzi od pestki, ale jest średnio smaczny. Owoce zbiera się zwykle w poł. VII. Trzeba je zrywać systematycznie, w krótkich odstępach czasu, zanim osiągną pełną dojrzałość, gdyż wtedy łatwo opadają. Pomiędzy zbiorem pierwszych i ostatnich owoców upływają nieraz 2 tygodnie. Masa owocu jest silnie skorelowana z plennością drzew i może wynosić od 30 do 50 g. ■