



'LANDSBERSKA'

Synonimy:

'Reneta Landsberska', 'Landsberger Renette',
'Landsberger Reinette'

Pochodzenie:

odmiana wyhodowana
w Landsbergu nad Wartą



Rodowód:

nieznany

Drzewo:

duże z kulistą, lekko zagęszczającą się koroną. Wchodzenie w owocowanie wczesne. Obfite plonowanie zwykle co drugi rok

Podatność na choroby:

mała na parcha jabłoni

Wytrzymałość na mróz:

dość duża

Owoce:

średniej wielkości do dużych, kulistostożkowate, rzadziej kuliste nieco spłaszczone, zielonkawożółte, czasami z niewielkim, różowawopomarańczowym, rozmytym rumieńcem. Kielich duży, otwarty lub półotwarty. Szypułka średniej długości, stosunkowo cienka. Mięszk żółtawobiały lub zielonkawobiały, średnio luźny, chrupki, soczysty, kwaskowatosłodki

Dojrzałość zbiorcza:

trzecia dekada września

Dojrzałość konsumpcyjna:

2 do 6 tygodni

Właściwości użytkowe:

owoce do bezpośredniego spożycia, przerobu (na sok) i wykorzystania w kuchni

Praca wykonana w ramach Programu Wieloletniego „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, finansowanego przez MRiRW.

Zadanie 1.7 – Poszerzanie różnorodności gatunków i odmian roślin ogrodniczych na obszarach wiejskich oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych.