

'ANNA SPÄTH'

Synonimy:

'Anna Szpet', 'Anna Späthová'

Pochodzenie:

odmiana znaleziona na Węgrzech w 1870 r.,
a wprowadzona do uprawy przez zakład szkółkarski Späth w Berlinie.



foto: Agnieszka Glowacka

Rodowód:

nieznany

Drzewo:

rośnie średnio silnie. Tworzy kulistą koronę. Średnio wczesnie wchodzi w okres owocowania. Owocuje zwykle regularnie, obficie lub średnio obficie. Odmiana samopylna.

Podatność na choroby:

mała

Wytrzymałość na mroz:

duża

Owoce:

średniej wielkości, o masie 35-45g, owalne. Skórka brunatnofioletowa, na całej powierzchni pokryta jasnym nalotem i licznymi, nieregularnymi przetchlinkami. Miąższ zielonożółty, średnio jędrny, soczysty. Smak zależy od warunków pogodowych w czasie dojrzewania. Pestka średniej wielkości, owalna, zwykle niezbyt dobrze oddzielająca się od miąższu.

Termin zbioru:

od końca września do połowy października

Właściwości użytkowe:

odmiana deserowa i przetwórcza

Praca wykonana w ramach Programu Wieloletniego „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, finansowanego przez MRiRW.

Zadanie 1.7 – Poszerzanie różnorodności gatunków i odmian roślin ogrodnictwa na obszarach wiejskich oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych.