

'VANIER'

Synonimy

Brak

Pochodzenie

Kanada



Fot. Agnieszka Glowacka

Rodowód

'Burbank' x 'Wickson'

Drzewo

Rośnie średnio silnie i tworzy rozłożystą koronę. Wczesnie wchodzi w okres owocowania, plonuje bardzo obficie i regularnie.

Zapyłacze

'Shiro', 'Kometa'

Podatność na choroby

Mała

Wytrzymałość na mróz

Średnia

Owoce

Średniej wielkości lub duże, o masie 40-50 g, ale przy obfitym plonowaniu drobnieją, okrągłe. Skórka żółta do żółtopomarańczowej z intensywnym różowoczerwonym rumieńcem. Miąższ żółty lub lekko zaróżowiony, dość miękki, soczysty i aromatyczny. Smak zależy od warunków pogodowych i wielkości plonu. Pestka mała, okrągława, trudno oddziela się od miąższu.

Termin zbioru

Pierwsza lub druga dekada sierpnia.
Owoce dojrzewają nierównomiernie.

Właściwości użytkowe

Odmiana deserowa i przetwórcza

Praca wykonana w ramach dotacji celowej MRiRW

Zadanie 1.2. Zachowanie *ex situ* zasobów genowych ogrodnictwa roślin użytkowych.